

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

- 1.1 Algesal suractive®**
- 1.2 Σύνθεση:** Δραστική ουσία: diethylamino salicylate, myrtecamine.  
Έκδοχα: cetyl alcohol, polyethylene glycol stearate, ethylene glycol stearate, glycerol stearate, vaseline liquid, polyoxyethylated glycerides of oleic acid, condensate of castor oil and ethylene oxide, lavandin essence, hydrochloric acid 10 N, purified water.
- 1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή**  
Αλοιφή εξωτερικής χρήσης.
- 1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία**  
100mg Algesal suractive® περιέχουν 10g diethylamino salicylate και 1g myrtecamine.
- 1.5 Περιγραφή- Συσκευασία**  
Λευκή, άοσμη αλοιφή σε σωληνάκια των 100 γραμμαρίων.
- 1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία**  
Αντιρευματικό, αντιφλεγμονώδες, αναλγητικό φάρμακο.
- 1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας**  
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Αυστρίας  
Διανέμεται από τη BIAN A.E. Τηλ. 210 9883372
- 1.8 Παρασκευαστής**  
ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε., 49° χλμ ΑΥΛΩΝΑΣ

### ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

- 2.1 Γενικές πληροφορίες**  
Το βασικό πλεονέκτημα της σαλικυλικής δαιθυλαμίνης συνίσταται εις το ότι παρουσιάζει μεγάλη διεισδυτικής ικανότητα. Έτσι μετά από την εφαρμογή της με εντριβή στο δέρμα, η σαλικυλική δαιθυλαμίνη απορροφάται, εισδύει στους ιστούς, εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος και μεταφέρεται σε ολόκληρο το σώμα.  
Οι γενικότερες δράσεις της σαλικυλικής δαιθυλαμίνης είναι πλέον γνωστές. Πιστεύεται ότι ασκεί δράση τύπου cortisone-like, διεγείροντας τον άξονα υποφύσεως – επινεφριδίων, ασκώντας αναλγητική και αντιφλογιστική επίδραση. Το έκδοχο της αλοιφής Algesal suractive® είναι υδατοδιαλυτό, λευκό, άοσμο, δεν ερεθίζει το δέρμα και δεν λερώνει τα ενδύματα. Υποβοηθεί τη διεισδυτικότητα της σαλικυλικής δαιθυλαμίνης, διότι περιέχει ύδωρ το οποίο προάγει τον ιονισμό του ενεργού συστατικού του φαρμάκου. Το έκδοχο αυτό εξ' άλλου, δεν προκαλεί αφυδάτωση των ιστών.
- 2.2 Ενδείξεις**

Για την τοπική θεραπεία του πόνου, του οιδήματος και της φλεγμονής σε :

- τραύματα κατά την άθληση (διαστρέμματα, εξάρθρηματα, θλάσεις)
- ρευματισμούς των μαλακών μορίων (τενοντίτιδα, τενοντοθυλακίτιδα, θυλακίτιδα, ωμοβραχιόνιο σύνδρομο, φλεγμονή των μυών και περιαρθρίτιδα)
- εκδηλώσεις εκφυλισμού των αρθρώσεων των άκρων και της σπονδυλικής στήλης
- επιφανειακές θρομβοφλεβίτιδες.

### **2.3 Αντενδείξεις**

Υπερευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά του προϊόντος.

### **2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση**

#### **2.4.1 Γενικά**

Η Algesal suractive® θα πρέπει να εφαρμόζεται σε άθικτες επιφάνειες δέρματος και όχι σε τραύματα του δέρματος ή ανοικτές πληγές. Δεν επιτρέπεται να έλθει σ' επαφή με τα μάτια ή με τις μεμβράνες των βλεννογόνων. Προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση.

#### **2.4.2 Ηλικιωμένοι**

Καμία.

#### **2.4.3 Κόηση**

Δεν υπάρχουν στοιχεία τερατογένεσης κατά την διάρκεια χρήσης της Algesal suractive®.

#### **2.4.4 Γαλουχία**

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μην επιτρέπουν την χρήση της Algesal suractive® κατά την διάρκεια της γαλουχίας.

#### **2.4.5 Παιδιά**

Καλό είναι να μην χρησιμοποιείται σε βρέφη και παιδιά κάτω των 6 ετών.

#### **2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων**

Καμία.

#### **2.4.7 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα**

Αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας σε κάποιο από τα έκδοχα του φαρμάκου.

### **2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες**

Καμία αλληλεπίδραση δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα με τη χρήση της Algesal suractive®.

### **2.6 Δοσολογία**

Εφαρμόστε την αλοιφή Algesal suractive® με ελαφρά εντριβή σε όλη την πάσχουσα περιοχή μέχρις ότου διεισδύσει τελείως στην επιδερμίδα. Επαναλάβετε αυτές τις εντριβές κι άλλες φορές κατά την διάρκεια της

ημέρας. Η θεραπεία εφαρμόζεται επί όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την απαλλαγή από τον πόνο.

### **2.7 Υπερδοσολογία- Αντιμετώπιση**

Σε περίπτωση εμφάνισης σημαντικών συστηματικών παρενεργειών, σαν αποτέλεσμα κακής χρήσης ή τυχαίας υπερδοσολογίας (π.χ. σε παιδιά), επικοινωνήστε με το πλησιέστερο νοσοκομείο (κρατάτε μαζί σας την αρχική συσκευασία του προϊόντος).

### **2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες**

Κνησμός, ερύθημα, εμφάνιση εξανθήματος ή αίσθημα καύσου στο δέρμα μπορεί να εμφανισθεί.

### **2.9 Τι πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση που παραλείψετε να πάρετε κάποια δόση.**

Συνεχίστε τη θεραπεία κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.

### **2.10 Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ημερομηνία λήξης του προϊόντος.**

Μην χρησιμοποιείται την Algesal suractive® μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην συσκευασία.

### **2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος**

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος  $\leq 25^{\circ} \text{C}$ .

### **2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών**

Ιανουάριος 1995

## **3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

- \* Το φάρμακο αυτό το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
- \* Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.
- \* Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- \* Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε  
θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- \* Για την ασφάλεια και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- \* Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για τη υγεία σας.
- \* Να μην κρατάτε τα φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
- \* Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος

μακριά από τα παιδιά.

- 4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ**  
Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.