

Φύλλο οδηγιών για τον χρήστη

Oculosan®

Σύνθεση

Δραστικά συστατικά: Naphazoline nitrate, zinc sulphate.

Έκδοχα: Sodium chloride, hamamelis water, euphrasia tincture, ethanol absolute, orange-flower oil, lavender oil, sodium hydroxide 1N ή hydrochloric acid 1N, water for injections.

Συντηρητικό: Benzoxonium chloride.

Φαρμακοτεχνική μορφή

Κολλύριο διάλυμα.

Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία

Naphazoline nitrate 0,05 mg/ml και zinc sulphate 0,2 mg/ml.

Περιγραφή - Συσκευασία

Το κολλύριο διάλυμα Oculosan φέρεται σε πλαστικό φιαλίδιο των 10 ml.

Το φιαλίδιο είναι τοποθετημένο σε χάρτινο κουτί.

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία

Αγγειοσυσπαστικό - αντιαλλεργικό.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας

Laboratoires THEA

12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

ΓΑΛΛΙΑ

Τηλ.: +33 4 73 98 14 36

Παρασκευαστής

EXCELVISION, Annonay, Γαλλία

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

Γενικές πληροφορίες

Το Oculosan στη μορφή του κολλυρίου περιέχει νιτρική ναφαζολίνη και θειικό ψευδάργυρο και χρησιμοποιείται για την θεραπεία των τοπικών ερεθισμών.

Ενδείξεις

Ενδείκνυται για την προσωρινή ανακούφιση του κνησμού, καύσου, δακρύρροιας και ερυθρότητας του οφθαλμού.

Το προϊόν διαυγάζει, προστατεύει από περαιτέρω ερεθισμό του οφθαλμού και βοηθά στην απομάκρυνση βλεννών που προέρχονται από αλλεργία ή κρυολόγημα.

Αντενδείξεις

Αντενδείκνυται σε ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα (σύνδρομο SJOGREN).

Ειδικές προειδοποιήσεις και ειδικές προφυλάξεις κατά την χρήση

- Εάν έχετε γλαύκωμα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν παρά μόνον με ιατρική παρακολούθηση.

- Υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει αυξημένη ερυθρότητα του οφθαλμού.

Να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για διάστημα μεγαλύτερο των 72 ωρών, εκτός εάν ο ιατρός το συνιστά και με ιατρική παρακολούθηση. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή χειροτερεύουν,

πρέπει να σταματήσετε την χρήση και να συμβουλευθείτε τον ιατρό σας.
Εάν παρουσιασθεί δυνατός πόνος στον οφθαλμό, πονοκέφαλος, γρήγορη μεταβολή στην όραση, ξαφνική εμφάνιση κηλίδων, οξύ ερύθημα στον οφθαλμό, πόνοι στην έκθεση στο φως, πρέπει να συμβουλευθείτε αμέσως τον ιατρό σας.

- Να μην χρησιμοποιείται με μαλακούς φακούς επαφής.
- Δεν υπάρχει πρόβλημα για την χορήγηση στα παιδιά.
- Δεν υπάρχει πρόβλημα για την χορήγηση κατά την κύηση και γαλουχία στην συνιστώμενη δοσολογία.
- Ασθενείς με διαταραχή της όρασης μετά την εφαρμογή του φαρμάκου δεν πρέπει να οδηγούν οχήματα ούτε να χειρίζονται μηχανήματα.

Αλληλεπιδράσεις

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται και άλλη οφθαλμική αγωγή, πρέπει να προβλέπεται διάστημα 5' μεταξύ των δύο χορηγήσεων, για να μην γίνεται έκπλυση του δραστικού συστατικού.

Δοσολογία

1-2 σταγόνες κολλυρίου ενσταλάζεται μέχρι 4 φορές την ημέρα.

Υπερδοσολογία

Σε περίπτωση τοπικής υπερδοσολογίας, συνιστάται η έκπλυση με φυσιολογικό ορό ή νερό.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθηνών: 210 779 3777

Τι πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση που παραλείψατε μία δόση

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να λάβετε αμέσως την επόμενη δόση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Στην συνιστώμενη δοσολογία σπανίως προκαλούνται ανεπιθύμητες ενέργειες. Εντούτοις, παρατεταμένη χορήγηση δεν συνιστάται γιατί μπορεί να προκαλέσει τοπική υπεραίμια και επίσπευση εκδήλωσης λανθανουσών παθολογικών καταστάσεων.

Ημερομηνία λήξης του προϊόντος

Αναγράφεται στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει, να μην το χρησιμοποιείτε.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την φύλαξη του προϊόντος

Διατηρείται σε δροσερές συνθήκες. Το φιαλίδιο πρέπει να κλείνεται καλά μετά από κάθε χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το φάρμακο ένα μήνα μετά το άνοιγμα του φιαλιδίου.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών: 08.06.2004

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (γενικά)

- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.
- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε, θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- Να μην διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία

- σας.
- Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
 - Για μεγαλύτερη ασφάλεια, κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το φάρμακο αυτό χορηγείται και χωρίς ιατρική συνταγή.