

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

THILODEXINE Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0,1% w/v Δεξαμεθαζόνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το THILODEXINE και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το THILODEXINE
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το THILODEXINE
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το THILODEXINE
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το THILODEXINE και ποια είναι η χρήση του

Το THILODEXINE οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα περιέχει το δραστικό συστατικό δεξαμεθαζόνη που είναι κορτικοστεροειδές. Η δεξαμεθαζόνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των φλεγμονωδών καταστάσεων των ματιών που οφείλονται σε διάφορους παράγοντες.

Αλλεργικές καταστάσεις επιπεφυκότα, κερατοειδούς και βλεφάρων, ανεξάρτητα αλλεργιογόνου αίτιου, συμπτωματικά. Άσηπτες φλεγμονώδεις καταστάσεις ραγοειδούς, σκληρού και επισκληρίου, όπως και κερατοειδούς. Επίσης χορηγούνται μετεγχειρητικά σε ενδοβολβικές κυρίως επεμβάσεις, τραύματα του βολβού και κερατοπλαστικές. Μπορούν να χορηγηθούν σε λοιμώξεις από αδενοϊούς και κοινά βακτηρίδια (επιπεφυκίτιδες) στις πρώιμες έντονες φάσεις της φλεγμονής αλλά κάτω από πλήρη χημειοθεραπευτική κάλυψη. Γενικά πάντως καλό είναι να αποφεύγονται σε όλες τις λοιμώδεις καταστάσεις του οφθαλμού.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το THILODEXINE

Μην χρησιμοποιήσετε το THILODEXINE:

- Σε περίπτωση αλλεργίας στη δεξαμεθαζόνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- Εάν έχετε ή νομίζετε ότι έχετε:
 - ο Μη θεραπευμένη βακτηριακή λοίμωξη στο μάτι.
 - ο Κερατίτιδα από ιό του απλού έρπητα, ευλογιά, ανεμοβλογιά/έρπη ζωστήρα ή οποιαδήποτε άλλη ιογενή λοίμωξη στο μάτι.

- Μυκητιασικές παθήσεις του ματιού ή μη θεραπεύσιμες παρασιτικές λοιμώξεις των ματιών.
- Φυματίωση του ματιού.
- Γλαύκωμα ή εάν υπάρχει ιστορικό γλαυκώματος στην οικογένεια.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το THILODEXINE.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τις οφθαλμικές σταγόνες δεξαμεθαζόνης, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι δεν έχετε βλάβη των ματιών από ιό του απλού έρπητα
- Εάν χρησιμοποιείτε τις οφθαλμικές σταγόνες δεξαμεθαζόνης για διάστημα άνω των 10 ημερών, ελέγχετε συχνά τα μάτια σας στον οφθαλμίατρο

Εάν χρησιμοποιείτε το THILODEXINE οφθαλμικές σταγόνες για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί :

- Να έχετε αυξημένη πίεση στο(-α) μάτι(-α) σας. Θα πρέπει να ελέγχετε την πίεση των ματιών σας τακτικά κατά τη διάρκεια χρήσης του THILODEXINE. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε παιδιατρικούς ασθενείς, καθώς ο κίνδυνος οφθαλμικής υπέρτασης λόγω κορτικοστεροειδών μπορεί να είναι μεγαλύτερος στα παιδιά και μπορεί να συμβεί νωρίτερα από ό,τι στους ενήλικες. Το THILODEXINE δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε παιδιατρικούς ασθενείς.
- Να παρουσιάσετε καταρράκτη. Θα πρέπει να επισκέπτεστε το γιατρό σας τακτικά, εάν χρησιμοποιείτε το THILODEXINE σε μακροχρόνια βάση.
- Να παρουσιάσετε το σύνδρομο Cushing λόγω της εισόδου του φαρμάκου στο αίμα σας. Απευθυνθείτε στο γιατρό σας εάν εμφανίσετε οίδημα και αύξηση του σωματικού βάρους στον κορμό και στο πρόσωπο, καθώς αυτά είναι συνήθως οι πρώτες εκδηλώσεις ενός συνδρόμου που λέγεται σύνδρομο Cushing. Καταστολή της λειτουργίας των επινεφριδίων μπορεί να αναπτυχθεί μετά από τη διακοπή μιας μακροχρόνιας ή εντατικής θεραπείας με THILODEXINE. Απευθυνθείτε στο γιατρό σας προτού διακόψετε τη θεραπεία μόνοι σας. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι ιδιαίτερος σημαντικόι σε παιδιά και ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με ένα φάρμακο που ονομάζεται ριτοναβίρη ή κομπισιστάτη.
- Επικοινωνήστε με τον ιατρό σας, εάν έχετε θολή όραση ή άλλες οπτικές διαταραχές.
- Ο κίνδυνος αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης και/ή σχηματισμού καταρράκτη λόγω κορτικοστεροειδών είναι αυξημένος σε προδιατεθειμένους ασθενείς (π.χ. διαβήτη).
- Αποφύγετε τη χρήση του THILODEXINE για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Το THILODEXINE μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη δευτεροπαθών λοιμώξεων (που προκαλούνται από βακτήρια, μύκητες ή ιούς).
- Εάν τα συμπτώματά σας επιδεινωθούν ή επανεμφανιστούν ξαφνικά, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας. Μπορεί να γίνετε πιο επιρρεπής σε λοιμώξεις του ματιού με τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Εάν έχετε μια λοίμωξη, ο ιατρός σας θα σας συνταγογραφήσει ένα άλλο φάρμακο για τη θεραπεία αυτής της λοίμωξης.
- Τα κορτικοστεροειδή που εφαρμόζονται στο μάτι μπορεί να καθυστερήσουν την επούλωση του τραύματος στο μάτι σας. Τα τοπικά ΜΣΑΦ (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα) είναι επίσης γνωστό ότι επιβραδύνουν ή καθυστερούν την

επούλωση. Η ταυτόχρονη χρήση τοπικών ΜΣΑΦ και τοπικών στεροειδών μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων επούλωσης.

- Εάν έχετε μια διαταραχή που προκαλεί λέπτυνση των ιστών του οφθαλμού, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν από τη χρήση αυτού του φαρμάκου.
- Το THILODEXINE περιέχει ένα δραστικό συστατικό που μπορεί να δώσει θετικό αποτέλεσμα σε έλεγχο ντόπινγκ, όπως η εξέταση ούρων για κορτικοστεροειδή.

Παιδιά και έφηβοι

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του THILODEXINE σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί.

Το THILODEXINE δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Ηλικιωμένα άτομα

Παρότι δεν υπάρχουν ειδικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των οφθαλμικών κορτικοστεροειδών σε ηλικιωμένα άτομα, δεν αναμένεται να προκαλέσουν στα ηλικιωμένα άτομα διαφορετικές ανεπιθύμητες ενέργειες ή προβλήματα από αυτά που προκαλούν στους νεότερους ενήλικες.

Άλλα φάρμακα και THILODEXINE

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα.

Ενημερώστε το γιατρό σας ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιείτε τοπικά ΜΣΑΦ. Η ταυτόχρονη χρήση τοπικών στεροειδών και τοπικών ΜΣΑΦ μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα για προβλήματα επούλωσης του κερατοειδούς.

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν χρησιμοποιείτε ριτοναβίρη, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει την ποσότητα της δεξαμεθαζόνης στο αίμα.

Κύηση και θηλασμός

Το THILODEXINE δε συνιστάται για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Το THILODEXINE δε συνιστάται για χρήση κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ο θηλασμός θα πρέπει να διακόπτεται.

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας, πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Μπορεί να διαπιστώσετε ότι η όρασή σας είναι θολή για λίγη ώρα αμέσως μετά τη χρήση του THILODEXINE. Μην οδηγήσετε ή χειριστείτε μηχανήματα μέχρι να καθαρίσει η όρασή σας.

Το THILODEXINE περιέχει χλωριούχο βενζαλκόνιο

Η χρήση φακών επαφής δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της θεραπείας μιας φλεγμονής ή λοίμωξης των ματιών καθώς μπορεί να χειροτερέψει την κατάστασή σας.

Ένα συντηρητικό στο THILODEXINE (χλωριούχο βενζαλκόνιο) μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και είναι επίσης γνωστό ότι αποχρωματίζει τους μαλακούς φακούς επαφής. Εάν ο γιατρός σας θεωρεί ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε φακούς επαφής, θα πρέπει να τους βγάζετε πριν από τη χρήση του THILODEXINE και να περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά προτού ξαναβάλετε τους φακούς σας.


3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το THILODEXINE

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

- Χρησιμοποιείτε το THILODEXINE μόνο για ενστάλαξη στο (-α) μάτι (-α) σας.
 - Κρατήστε το βλέφαρο κλειστό, ενώ ταυτόχρονα ασκείτε ελαφρά πίεση με ένα δάχτυλο στη γωνία του ματιού δίπλα στη μύτη για τουλάχιστον 2 λεπτά για να περιορίσετε την ποσότητα του φαρμάκου που θα εισέλθει στο αίμα μετά τη χορήγηση των οφθαλμικών σταγόνων.

Η συνιστώμενη δόση είναι μία ή δύο σταγόνες στο σάκο του επιπεφυκότα, 3-5 φορές την ημέρα (σε σοβαρές περιπτώσεις η ενστάλαξη μπορεί να γίνεται κάθε ώρα). Παρατεταμένη χρήση και συχνές ενσταλάξεις θα πρέπει να γίνονται μόνο μετά από σύσταση του γιατρού.


Χρησιμοποιήστε το THILODEXINE μόνο για ενστάλαξη στο(-α) μάτι(-α) σας.



1



2



3



4

- Πάρτε τη φιάλη με το THILODEXINE και έναν καθρέπτη.
- Πλύνετε τα χέρια σας.
- Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση.
- Ξεβιδώστε το πώμα.
- Αφού αφαιρέσετε το πώμα, εάν το περιλαίμιο ασφάλειας είναι χαλαρό, αφαιρέστε το πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Κρατήστε τη φιάλη, με το ρύγχος προς τα κάτω, μεταξύ του αντίχειρα και του μεσαίου δακτύλου σας (εικόνα 1).
- Κρατήστε το κεφάλι σας γεμμένο προς τα πίσω. Τραβήξτε προς τα κάτω το βλέφαρό σας με ένα καθαρό δάχτυλο, μέχρι να δημιουργηθεί μία «τσέπη» μεταξύ του βλεφάρου και του ματιού σας. Η σταγόνα θα πέσει μέσα εδώ (εικόνα 2).
- Φέρτε το ρύγχος της φιάλης κοντά στο μάτι. Χρησιμοποιήστε τον καθρέπτη εάν βοηθάει.
- Μην αγγίζετε το μάτι σας ή το βλέφαρό σας, τις γύρω περιοχές ή άλλες επιφάνειες με το ρύγχος. Μπορεί να μολυνθούν οι σταγόνες που έχουν μείνει μέσα στη φιάλη.
- Πιέστε απαλά με το δείκτη τη βάση της φιάλης, ώστε να απελευθερώνεται μία σταγόνα THILODEXINE κάθε φορά (εικόνα 3).
- Μην πιέζετε υπερβολικά τη φιάλη: είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να χρειάζεται μόνο μια ελαφρά πίεση στη βάση της.
- Μετά τη χρήση του THILODEXINE, αφήστε το κάτω βλέφαρο, κλείστε το μάτι σας και πιέστε απαλά με ένα δάχτυλο τη γωνία του ματιού, κοντά στη μύτη για 2 λεπτά (εικόνα 4). Αυτό βοηθάει ώστε το THILODEXINE να μην περάσει στο υπόλοιπο σώμα.

- Εάν βάζετε σταγόνες και στα δύο μάτια, επαναλάβετε τη διαδικασία για το άλλο σας μάτι.
- Βιδώστε καλά το πώμα στη φιάλη αμέσως μετά τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε ολόκληρη τη φιάλη πριν ανοίξετε την επόμενη.

Εάν μία σταγόνα ξεφύγει από το μάτι σας, προσπαθήστε πάλι.

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες φαρμακευτικές οφθαλμικές σταγόνες ή αλοιφές, αφήστε να μεσολαβήσουν τουλάχιστον 5 λεπτά μεταξύ της χρήσης του κάθε φαρμάκου. Οι οφθαλμικές αλοιφές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τελευταίες.

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση THILODEXINE από την κανονική, ξεπλύνετε το μάτι σας με χλιαρό νερό. Μην βάζετε άλλες σταγόνες μέχρι να έρθει η ώρα της επόμενης τακτικής σας δόσης. Αν έχετε επίμονα προβλήματα συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Αν από ατύχημα καταπιείτε το THILODEXINE συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το THILODEXINE, συνεχίστε με την επόμενη δόση σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμά σας. Ωστόσο, εάν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση σας, παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε και επανέλθετε στο κανονικό δοσολογικό σας πρόγραμμα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε αυτή που ξεχάσατε.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί με το THILODEXINE:

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
(μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα):

Αντιδράσεις στο μάτι: ενόχληση στο μάτι

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
(μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα):

Αντιδράσεις στο μάτι: φλεγμονή στην επιφάνεια του ματιού, ξηροφθαλμία, χρώση κερατοειδούς, ευαισθησία στο φως, θολή όραση, μη φυσιολογικό αίσθημα στο μάτι, αυξημένη παραγωγή δακρύων, εφελκίδα του βλεφάρου, φαγούρα στο μάτι, ερεθισμός του ματιού (π.χ. κάψιμο, τσίμπημα, φαγούρα, παραγωγή δακρύων) ή κοκκινίλα.

Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες: άσχημη γεύση

Μη γνωστές

(η συχνότητα δε μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

Αντιδράσεις στο μάτι: γλαύκωμα, έλκος του κερατοειδούς, αυξημένη πίεση στο (-α) μάτι (-α), καταρράκτης, μειωμένη όραση, βλάβη του κερατοειδούς, πτώση του βλεφάρου, πόνος στο μάτι, αύξηση του μεγέθους της κόρης.

Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες: σύνδρομο Cushing, επινεφριδιακή ανεπάρκεια, αλλεργία, ζάλη, πονοκέφαλος.

Ορμονικά προβλήματα: ανάπτυξη επιπλέον τριχών του σώματος (κυρίως στις γυναίκες), μυϊκή αδυναμία και εξασθένηση, μωβ ραγάδες στο δέρμα του σώματος, αυξημένη αρτηριακή πίεση, ακανόνιστο κύκλο περιόδου ή μη εμφάνιση περιόδου, αλλαγές στα επίπεδα της πρωτεΐνης και του ασβεστίου στο σώμα σας, καχεκτική ανάπτυξη στα παιδιά και στους εφήβους και οίδημα και αύξηση του σωματικού βάρους και του προσώπου (που ονομάζεται «σύνδρομο Cushing»).

Μπορεί να παρουσιαστούν σπάνιες συστηματικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που οφείλονται στην απορρόφηση του φαρμάκου μετά από παρατεταμένη χρήση.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>

Κύπρος

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Υπουργείο Υγείας

CY-1475 Λευκωσία

Φαξ: + 357 22608649

Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

5. Πώς να φυλάσσετε το THILODEXINE

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη φιάλη και στο κουτί μετά τη «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Φυλάσσεται σε δροσερές συνθήκες (10-20°C).

Πρέπει να πετάτε τη φιάλη 4 εβδομάδες μετά το πρώτο άνοιγμά της, για να αποφύγετε τις μολύνσεις και να χρησιμοποιείτε μία νέα φιάλη.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το THILODEXINE

Η δραστική ουσία είναι η δεξαμεθαζόνη. Κάθε mL διαλύματος περιέχει 1 mg δεξαμεθαζόνης.

Τα υπόλοιπα συστατικά είναι Benzalkonium chloride (βλ. παράγραφο 2 «Το THILODEXINE περιέχει χλωριούχο βενζαλκόνιο»), Sodium chloride, Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium phosphate dibasic dehydrate, Disodium edetate, Sodium metabisulphite. Water purified.

Εμφάνιση του THILODEXINE και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το THILODEXINE είναι ένα υγρό (άχρωμο έως υποκίτρινο διάλυμα) που διατίθεται σε πλαστικές φιάλες των 5 ml με σταγονομετρικό ρύγχος και βιδωτό πώμα.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.

Λεωφόρος Κηφισίας 132,

Περιστέρι 12131,

Ελλάδα

Τηλ: 210 5199200

Φαξ: 210 5144279

e-mail: info@pharmex.gr

Παραγωγός

COOPER S.A.

Οδός Αριστοβόλου 64, 11853, Αθήνα,

Ελλάδα

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις MM/EEEE.