

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη>

Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ διαλύτης για παρεντερική χρήση

ύδωρ για ενέσιμα

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το νοσοκόμο σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

- 1 Τι είναι το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ και ποια είναι η χρήση του
- 2 Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ
- 3 Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ
- 4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
- 5 Πώς να φυλάσσετε το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ
- 6 Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ και ποια είναι η χρήση του

Το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ είναι καθαρό, αποστειρωμένο νερό.

Χρησιμοποιείται για την διάλυση φαρμάκων πριν από την χορήγηση. Για παράδειγμα φάρμακα που χορηγούνται με:

- ένεση (χορηγούμενα χρησιμοποιώντας βελόνα, για παράδειγμα στην φλέβα σας)
- έγχυση (αργή ένεση) σε μια φλέβα, ονομάζεται επίσης «στάγδην».

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ

Μην χρησιμοποιήσετε το το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ

Δεν πρέπει να λαμβάνετε το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ μόνο του. Εάν ενεθεί στην κυκλοφορία του αίματός σας μόνο του, μπορεί να προκαλέσει στα ερυθροκύτταρα να απορροφήσουν νερό και να σχάσουν (αιμόλυση). Αυτό συμβαίνει γιατί το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ δεν έχει την ίδια πυκνότητα με το αίμα σας.

Το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ θα αναμιγνύεται πάντοτε με ένα ή περισσότερα φάρμακα από έναν επαγγελματία του τομέα υγειονομικής περίθαλψης πριν σας χορηγηθεί.

Πρέπει να διαβάσετε το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ του φαρμάκου σας ή των φαρμάκων σας τα οποία θα αναμιχθούν με το Water for injection/Fresenius. Αυτά θα σας πληροφορήσουν για το αν μπορείτε ή όχι να πάρετε το διάλυμα.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Ύδωρ ενέσιμο/

BIOΣEP.

Το Ύδωρ ενέσιμο/ BIOΣEP δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του. Προτού χρησιμοποιήσετε το Ύδωρ ενέσιμο/ BIOΣEP:

- θα πρέπει να αναμιχθεί πάντοτε με ένα ή περισσότερα φάρμακα
- ο επαγγελματίας του τομέα υγειονομικής περίθαλψης θα διασφαλίσει ότι το μίγμα είναι περίπου στην ίδια πυκνότητα με το αίμα σας (ισοτονικό). Ανάλογα με το είδος του φαρμάκου που σας χορηγείται, αυτό θα σημαίνει ότι:
- το φάρμακο χρειάζεται να αραιωθεί με το Ύδωρ ενέσιμο/ BIOΣEP
- θα χρειαστεί να προστεθεί άλλη μία ουσία στο μίγμα του το Ύδωρ ενέσιμο/ BIOΣEP και του φαρμάκου πριν από την χορήγηση.

Είναι πιο πιθανό να πάθετε αιμόλυση εάν σας χορηγηθούν μεγάλοι όγκοι υποτονικών διαλυμάτων το Ύδωρ ενέσιμο/ BIOΣEP (διαλύματα τα οποία δεν είναι τόσο συμπυκνωμένα όσο το αίμα σας).

Για να βοηθήσει την πρόληψη αυτού, ο γιατρός σας θα λάβει ένα δείγμα αίματος για να παρακολουθεί την ισορροπία των χημικών ουσιών στο αίμα σας (την ιοντική ισορροπία).

Προτού σας χορηγηθούν φάρμακα αναμεμιγμένα με το Ύδωρ ενέσιμο/ BIOΣEP ο γιατρός σας θα ελέγξει ότι:

- τα φάρμακα είναι σταθερά στο το Ύδωρ ενέσιμο/ BIOΣEP
- τα φάρμακα δεν θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους

Παιδιά

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για τα παιδιά.

Ηλικιωμένοι

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για τους ηλικιωμένους.

Άλλα φάρμακα και Ύδωρ ενέσιμο/ BIOΣEP

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων που διαλύονται στο Ύδωρ ενέσιμο/ BIOΣEP.

Πριν την προσθήκη φαρμάκων επιβεβαιώστε:

-Ότι αυτά είναι διαλυτά και σταθερά στο ύδωρ, στο pH του Water for Injections.

- Ότι αυτά είναι μεταξύ τους συμβατά.

To water for injection/Fresenius με τροφές και ποτά

Πρέπει να ρωτήσετε τον γιατρό σας σχετικά με το τί μπορείτε να φάτε ή να πιείτε.

Κύηση και θηλασμός

Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Οποιοσδήποτε κίνδυνος προς το αγέννητο βρέφος ή την εγκυμοσύνη σας θα εξαρτάται από το ποιά φάρμακα, αναμεμιγμένα με το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ, χρησιμοποιείτε.

Οποιοσδήποτε κίνδυνος προς το βρέφος σας κατά την διάρκεια του θηλασμού θα εξαρτάται επίσης από το ποιά φάρμακα, αναμεμιγμένα με το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ, χρησιμοποιείτε.

Ο γιατρός σας θα μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τους κινδύνους που περιλαμβάνονται κατά την χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων.

Ο γιατρός σας θα σας χορηγήσει φάρμακα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης σας ή του θηλασμού μόνον εάν είναι απαραίτητο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ δεν επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Οποιαδήποτε επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών θα εξαρτηθεί από τα φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται αναμεμιγμένα με το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ.

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ

Το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ θα σας χορηγηθεί από τον γιατρό ή τον/την νοσοκόμο/α σας.

Ο γιατρός σας θα αποφασίσει σχετικά με το πόσο χρειάζεστε και τότε και πως θα σας χορηγηθεί.

Αυτό θα εξαρτηθεί από το φάρμακο ή τα φάρμακα που χρειάζεται να πάρετε μαζί με το Water for injection/Fresenius.

Ο γιατρός επίσης θα λάβει υπόψη την ηλικία σας, το βάρος σας, την κατάστασή σας και ποιές άλλες θεραπείες λαμβάνετε.

ΔΕΝ πρέπει να σας χορηγηθεί το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ εάν υπάρχουν αιωρούμενα σωματίδια στο νερό ή εάν ο περιέκτης δεν είναι άθικτος καθιονδήποτε τρόπο.

Χειρισμός και Προετοιμασία

Απορρίψτε μετά από την πρώτη χρήση.

Απορρίψτε οποιαδήποτε αχρησιμοποίητη ποσότητα.

Μην επανασυνδέετε μερικώς χρησιμοποιημένους περιέκτες.

Εαν υπάρχει στη συσκευασία εσωτερικός σάκος μη αφαιρείτε το σάκο από τον επιθύλακα μέχρι να είστε έτοιμοι για χρήση. Ο εσωτερικός σάκος διατηρεί τη στείριότητα του προϊόντος.

Χρησιμοποιήστε μόνο εάν το διάλυμα είναι διαυγές χωρίς ορατά σωματίδια και εάν ο περιέκτης δεν έχει υποστεί βλάβη. Χορηγήστε αμέσως μετά την εισαγωγή της συσκευής έγχυσης.

Επιβάλλεται η πλήρης και προσεκτική ανάμειξη οποιουδήποτε πρόσθετου φαρμάκου υπό άσηπτες συνθήκες.

Το διάλυμα θα πρέπει να χορηγείται με αποστειρωμένο εξοπλισμό, χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να εξαερώνεται, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή αέρα στο σύστημα.

Το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ δεν θα πρέπει να εγχέεται μόνο του.

Πριν την παρεντερική χορήγηση, κάνετε το προς έγχυση διάλυμα ισότονο.

Οι ακόλουθοι όγκοι πλήρωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ετοιμασία του τελικού διαλύματος.

65ml για τον περιέκτη των 50ml

115ml για τον περιέκτη των 100ml

166ml για τον περιέκτη των 150ml

275ml για τον περιέκτη των 250ml

530ml για τον περιέκτη των 500ml

1047ml για τον περιέκτη των 1000ml.

Τα πρόσθετα φάρμακα μπορεί να εισαχθούν πριν την έγχυση ή κατά τη διάρκεια της έγχυσης μέσω της επανασφραγιζόμενης θέσης προσθήκης φαρμάκων.

Διαλύματα που περιέχουν πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την ετοιμασία τους, εκτός εαν εάν η ετοιμασία έχει πραγματοποιηθεί κάτω από ελεγχόμενες και τεκμηριωμένα άσηπτες συνθήκες.

Η προσθήκη άλλου σκευάσματος ή η χρήση λανθασμένης τεχνικής χορήγησης μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση πυρετικών αντιδράσεων, λόγω της πιθανής εισαγωγής πυρετογόνων. Σε περίπτωση ανεπιθύμητων αντιδράσεων, η έγχυση πρέπει να διακόπτεται αμέσως.

Μην χρησιμοποιείτε πλαστικούς περιέκτες σε εν σειρά συνδέσεις. Τέτοια χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα εμβολισμό από αέρα, λόγω του υπολειπόμενου αέρα που εξάγεται από τον πρώτο περιέκτη πριν ολοκληρωθεί η χορήγηση του υγρού από το δεύτερο περιέκτη.

Για να ανοίξετε

Ελέγξτε για μικροδιαρροές πιέζοντας σταθερά τον εσωτερικό σάκο. Εάν διαπιστωθεί διαρροή, απορρίψτε το διάλυμα καθώς η στειρότητα μπορεί να έχει επηρεαστεί.

Προετοιμασία για τη χορήγηση μετά την επίτευξη της ισοτονικότητας

1. Αναρτήστε τον περιέκτη από το ειδικό στήριγμα
2. Απομακρύνετε την ασφάλεια από τη θυρίδα στη βάση του περιέκτη.
3. Εφαρμόστε άσηπτη τεχνική για τη ρύθμιση της έγχυσης.
4. Συνδέστε τη συσκευή χορήγησης. Συμβουλευθείτε τις πλήρεις οδηγίες της συσκευής χορήγησης.

Προειδοποίηση: Τα πρόσθετα μπορεί να μην είναι συμβατά.

Για την προσθήκη φαρμακευτικού σκευάσματος πριν τη χορήγηση

1. Απολυμαίνετε τη θέση χορήγησης φαρμάκου.
2. Χρησιμοποιώντας σύριγγα με βελόνα 19-22 gauger διατηρήσατε την επανασφραγιζόμενη θέση προσθήκης φαρμάκου και εμπλουτίστε.
3. Αναμείξτε το διάλυμα και το φάρμακο πολύ καλά. Για υψηλής πυκνότητας φάρμακα όπως το potassium chloride/χλωριούχο κάλιο χτυπήστε ελαφρά τις θυρίδες χορήγησης ενώ είναι γυρισμένες προς τα πάνω και αναμείξτε.

Για την προσθήκη φαρμακευτικού σκευάσματος κατά τη διάρκεια της χορήγησης

1. Κλείστε τη στρόφιγγα της συσκευής χορήγησης.
2. Απολυμάνετε τη θέση προσθήκης φαρμάκου.
3. Χρησιμοποιώντας σύριγγα με 19-22 gauge, διατρήσατε την επανασφραγιζόμενη θέση προσθήκης φαρμάκου και εμπλουτίστε.
4. Απομακρύνετε τον περιέκτη από το σημείο ανάρτησης και/ή γυρίστε τον στην ανάποδη θέση.

5. Εκκενώστε και τις δύο θέσεις χτυπώντας ελαφρά ενώ ο σάκος είναι στην ανάποδη θέση.
6. Αναμειξτε το διάλυμα και το φάρμακο παρά πολύ καλά.
7. Επαναφέρατε τον περιέκτη στη θέση χρήσης, ξανανοιξάτε τον σφιγκτήρα και συνεχίστε τη χορήγηση.

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ από την κανονική

Εάν σας χορηγηθεί πολύ περισσότερο Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ (υπερβολική έγχυση) αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αιμόλυση. Κατά την αιμόλυση τα ερυθροκύτταρα του αίματός σας απορροφούν νερό και σχάζουν. Τα φάρμακα που αναμειγνύονται με το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ μπορούν επίσης να προκαλέσουν συμπτώματα εάν χορηγηθούν σε πολύ μεγάλες ποσότητες (υπερβολική έγχυση). Τα σημεία και συμπτώματα της υπερδοσολογίας θα εξαρτηθούν από το είδος των φαρμάκων που χρησιμοποιείτε αναμειγμένα με το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ .

Αν σας δοθεί μια υπερβολική δόση κατά λάθος, η θεραπεία σας θα σταματήσει και θα σας δοθεί θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

Θα πρέπει να διαβάσετε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης των φαρμάκων που αναμειγνύονται με το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ για μια λίστα με πιθανά συμπτώματα της υπερβολικής έγχυσης.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό σας .

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ

Το φάρμακο είναι νοσοκομειακής χρήσης και εν προκειμένω πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του γιατρού.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Μπορεί να συμβεί σχάσιμο των ερυθροκυττάρων του αίματός σας (αιμόλυση) εάν:

- χρησιμοποιήσετε το το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ μόνο του
- το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ενέσιμα διαλύματα ή τα διαλύματα προς έγχυση τα οποία δεν είναι παρόμοιας πυκνότητας με το αίμα σας (ισότονα).

Εάν έχει προστεθεί ένα διάλυμα στο το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ, το προστιθέμενο διάλυμα μπορεί επίσης να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες εξαρτώνται από το φάρμακο που προστέθηκε. Πρέπει να διαβάσετε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης του προστιθέμενου φαρμάκου για μια λίστα πιθανών συμπτωμάτων.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ή ανησυχείτε για οτιδήποτε, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή φαρμακοποιό σας.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν

φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, τηλ: + 30 21 32040380/337, φαξ: + 30 21 06549585, ιστότοπος: <http://www.eof.gr>. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς φυλάσσεται το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην εξωτερική συσκευασία και στην ετικέτα του περιέκτη. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε ότι το διάλυμα δεν είναι διαυγές ή περιέχει ορατά σωματίδια και αν ο περιέκτης έχει υποστεί κάποια βλάβη.

Διάρκεια ζωής κατά την χρήση: Πρόσθετα

Η χημική και φυσική σταθερότητα οποιουδήποτε πρόσθετου προστιθέμενου φαρμάκου στο pH του Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν τη χρήση.

Από μικροβιολογικής άποψης το αραιωμένο προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως εκτός εάν η αραιώση έχει πραγματοποιηθεί κάτω από ελεγχόμενες και τεκμηριωμένα άσηπτες συνθήκες. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, ο χρόνος φύλαξης και οι συνθήκες πριν την χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη.

Μετά το πρώτο άνοιγμα το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ

Το μόνο συστατικό είναι το στείρο ύδωρ για ενέσιμα. Κάθε περιέκτης περιέχει 100% ύδωρ για ενέσιμα.

Εμφάνιση του Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Ύδωρ ενέσιμο/ ΒΙΟΣΕΡ είναι ένα διαυγές, άχρωμο, υδατικό διάλυμα, ελεύθερο από ορατά σωματίδια.

Διατίθεται στις ακόλουθες συσκευασίες:

- πλαστικές φιάλες πολυαιθυλενίου των 100, 500 και 1000 ml (με επίπωμα με latex)
- πλαστικές φιάλες πολυαιθυλενίου των 500 και 1000 ml (με επίπωμα χωρίς latex)
- σάκους PVC των 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000 και 3000 ml
- γυάλινες φύσιγγες των 2 ml, 5 ml και 10 ml και πλαστικές φύσιγγες πολυαιθυλενίου των 5 ml και 10 ml.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Τ. ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.9ο
ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24310-83441,2
Fax: 24310-83550

Παρασκευαστές

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Τ. ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.,
Ταξιάρχες, Τρίκαλα
LABESFAL - LABORATORIOS ALMIRO S.A., SANTIAGO DE BESTEIROS,
PORTUGAL (Fresenius Kabi Group), Lagedo, 3465-157, Πορτογαλία

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}
