

CYCLOGYL®

(Υδροχλωρική
κυκλοπεντολάτη) Οφθαλμικές
σταγόνες, διάλυμα 1%

ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστική

ουσία: Έκδοχα: Υδροχλωρική κυκλοπεντολάτη 10,0 mg/ml (1%)

Βενζαλκόνιο χλωριούχο (συντηρητικό), Βορικό οξύ, Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό νάτριο, Κάλιο χλωριούχο, Υδροχλωρικό οξύ και/ή Νάτριο ανθρακικό (μονοϋδρικό) (για ρύθμιση του pH) και Ύδωρ κεκαθαρμένο.

ΔΡΑΣΗ

Το αντιχολινηργικό αυτό ιδιοσκεύασμα προκαλεί αποκλεισμό των απαντήσεων στα χολινηργικά ερεθίσματα του σφιγκτήρα μυ της ίριδας και του μυ προσαρμοστικότητας του ακτινωτού σώματος με συνέπεια την εμφάνιση κορικής διαστολής (μυδρίαση) και παράλυση της προσαρμογής του φακού (κυκλοπληγία). Δρα ταχέως αλλά έχει μικρότερη διάρκεια από εκείνη της ατροπίνης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

-Πρόκληση μυδρίασης και κυκλοπληγίας για διαγνωστικούς λόγους.

-Θεραπευτικώς στην πρόσθια ραγοειδίτιδα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Στα ηλικιωμένα και άλλα άτομα όπου είναι δυνατό να παρατηρηθεί αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, η χρήση των μυδριατικών και κυκλοπληγικών φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή. Συνιστάται η τονομέτρηση του ασθενούς προ της ενστάλαξης. Η συστηματική απορρόφηση του φαρμάκου δυνατόν να μειωθεί διά της πίεσεως του δακρυϊκού σάκκου για ένα ή δύο λεπτά κατά τη διάρκεια και μετά την ενστάλαξη των σταγόνων. Με την πίεση του σάκκου επιτυγχάνεται αποκλεισμός της διόδου των σταγόνων σε ευρύτερες περιοχές ρινοφαρυγγικού βλεννογόνου. Η παραπάνω ενέργεια συνιστάται κατά τη χρήση διαλυμάτων μεγαλύτερων πυκνοτήτων (2 %) και ιδίως στα παιδιά.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Υπερευαίσθησία στο φάρμακο και γλαύκωμα κλειστής ή στενής γωνίας.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Έχουν παρατηρηθεί ψυχωτικές αντιδράσεις και διαταραχές της συμπεριφοράς στα παιδιά με τη χρήση της Κυκλοπεντολάτης ιδιαίτερα σε διαλύματα μεγαλύτερων πυκνοτήτων (2%). Έχουν επίσης αναφερθεί αταξία, ασυναρτησία, ανησυχία, παραισθήσεις, ανικανότητα προσανατολισμού ως προς το χρόνο και χώρο, αδυναμία αναγνώρισεως προσώπων και ταχυκαρδία.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Ενήλικες: Μία σταγόνα ακολουθούμενη από δεύτερη σταγόνα σε 5 λεπτά. Παρά το γεγονός ότι πλήρης αποκατάσταση επέρχεται συνήθως σε 24 ώρες, στα περισσότερα μάτια η χρήση μιας ή δύο σταγόνων πιλοκαρπίνης 1% ή 2% μειώνει το χρόνο αποκαταστάσεως σε 3 έως 6 ώρες. Σε ασθενείς με σκοτεινόχρωμες ίριδες συνιστάται η χρήση διαλύματος πυκνότητας 2%. Το διάλυμα πυκνότητας 1% επίσης επιτυγχάνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η ενστάλαξη ακολούθως πιλοκαρπίνης 2% μειώνει το χρόνο αποκαταστάσεως σε 6 ώρες ή λιγότερο.

Παιδιά: Συνήθως δεν είναι αναγκαία η χορήγηση CYCLOGYL® την προηγούμενη της εξέτασης. Μία σταγόνα διαλύματος πυκνότητας 1% ενσταλάζεται σε κάθε μάτι και εάν είναι αναγκαίο 5 λεπτά αργότερα ενσταλάζεται μία δεύτερη σταγόνα διαλύματος 1%. Σε σπάνιες περιπτώσεις, αναφέρθηκαν συμπτώματα όμοια της ατροπίνης στα παιδιά στα οποία χορηγήθηκε υπερδοσολογία διαλύματος πυκνότητας 2%.

ΦΥΛΑΞΗ

Φυλάσσετε σε

θερμοκρασία

μικρότερη των 30°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σταγονομετρικά
φιαλίδια
DROPTAINER® των
15 ml. Χρώμα
διαλύματος: Υπόλευκο

ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SA ALCON-COUVREUR NV - ΒΕΛΓΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Κηφισίας 18, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 2106878300

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
20740/1-4-2008

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:
A. ROTAMITIS MEDICARE LTD

Λ
ε
ω
φ
·

A
ρ
χ
·

K
υ
π
ρ
ι
α
ν
ο
ύ

6
2

2
0
5
9

Σ
τ
ρ
ό
β
ο
λ
ο
ς
,

Λ
ε
υ
κ
ω
σ
ί
α

Τηλ.: 0035722583333

ΑΡ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:

S00117 Τηλ. Κέντρου

Δηλητηριάσεων: 2107793777