

THIOLOGE L®

Ο
Φ
θ
α
λ
μ
ι
κ
ή
Γ
έ
λ
η
0
,
3
%
Σ
υ
ν
θ
ε
τ
ι
κό
π
ο
λ
υ
μ
ε
ρ
ές
ω
ς
υ
π
ο
κ
α
τ
ά
σ
τ
α
το
ο
δ
α
κ
ρ
ύ
ω
ν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το THIOLOGEL® είναι άχρωμη, διαυγής, ισότονη γέλη, με φυσιολογική τιμή pH και πολύ καλή ανοχή, για οφθαλμική χρήση.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

1 g THIOLOGEL περιέχει 3,00 mg Carbomer (Καρβομέρη), 50 mg Σορβιτόλη, 0,05 mg Βενζαλκάνιο χλωριούχο (συντηρητικό), Νατρίου υδροξειδίου (για ρύθμιση του pH) και Ύδωρ κεκαθαρμένο.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Το THIOLOGEL σχηματίζει ένα προστατευτικό και λιπαντικό φιλμ στον κερατοειδή και χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο δακρύων. Το THIOLOGEL έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, σε περιπτώσεις ξηροφθαλμίας, διάφορης αιτιολογίας, επειδή η γέλη ενυδαώνει τον κερατοειδή και τον επιπεφυκότα για μεγάλο χρονικό διάστημα, συγκρινόμενο με άλλα συνηθισμένα υποκατάστατα δακρύων, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά. Παρά το αυξημένο ιξώδες του, το THIOLOGEL, αναμιγνύεται εύκολα με τα δάκρυα και σχηματίζει στην οφθαλμική επιφάνεια ένα διαφανές φιλμ που, χωρίς να παρεμποδίζει τις οπτικές λειτουργίες, υποκαθιστά ανεπαρκή όγκο ή ελαττωματική ποιότητα δακρύων επιτρέποντας το παίξιμο των βλεφάρων χωρίς ερεθισμό.

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Το THIOLOGEL πρέπει να παραμένει, όσο το δυνατόν περισσότερο, στην οφθαλμική επιφάνεια, χωρίς να διαπερνά τον κερατοειδή. Ο μέσος χρόνος επαφής του THIOLOGEL με την επιφάνεια του οφθαλμού είναι 26,8 λεπτά. Το πολυμερές Carbomer δεν αναμένεται να διαπερνά τον

κερατοειδή, εξ αιτίας του μεγάλου μοριακού του βάρους, ενώ η απορρόφηση της Σορβιτόλης δεν έχει επίδραση στην οφθαλμική λειτουργία.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Καταστάσεις ξηροφθαλμίας, διάφορης αιτιολογίας. Σαν υποκατάστατο δακρύων, για όλες τις καταστάσεις με ανεπαρκή ή ελαττωματική ύγρωση της οφθαλμικής επιφάνειας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Υπερευαισθησία έναντι οποιουδήποτε συστατικού του προϊόντος.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Παροδικές οπτικές διαταραχές και ήπιος καύσος, μέχρις ότου η γέλη κατανεμηθεί ομοιόμορφα, στην οφθαλμική επιφάνεια.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ:

Δ

ε

ν

α

ν

α

φ

έ

ρ

ο

ν

τ

α

ι

α

λ

λ

η

λ

ε

π

ι

δ

ρ

ά
σ
ε
ι
ς

μ
ε

ά
λ
λ
α

φ
ά
ρ
μ
α
κ
α
.

Π
Ρ
Ο
Σ
Ο
Χ
Η

Σ
Τ
Η

Χ
Ο
Ρ
Η
Γ
Η
Σ
Η

:
Το THIOGEL
περιέχει το συστατικό
Βενζαλκόνιο
χλωριούχο
(συντηρητικό) το
οποίο μπορεί να

προκαλέσει ερεθισμό των οφθαλμών. Αποφύγετε την επαφή με τους μαλακούς φακούς επαφής. Βγάλτε τους φακούς επαφής πριν χρησιμοποιήσετε το THIOLOGEL και περιμένετε 15 λεπτά προτού φορέσετε πάλι τους φακούς σας. Μπορεί να αποχρωματίσει τους μαλακούς φακούς επαφής. Κατά την χρήση, το άκρο του σωληναρίου να μην αγγίζει, οποιαδήποτε επιφάνεια, προς αποφυγή μόλυνσης του περιεχομένου.

**ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ:**

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σε έγκυες γυναίκες. Το πολυμερές Carbomer δεν απορροφάται κατά την τοπική εφαρμογή ενώ τα υπόλοιπα συστατικά δεν αναμένεται να προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη, στη συνιστώμενη δοσολογία.

**ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:**

Δεν αναφέρεται καμιά επίδραση.

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ:

Δεν αναφέρεται καμιά κύρια ασυμβατότητα.

**ΛΗΨΗ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ
ΔΟΣΗΣ -
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:**

Δεν

εφαρμόζετ

αι εξ αιτίας

των

ιδιοτήτων

του

προϊόντος

και του

τρόπου

χορήγησης.

ΔΟΣΟΛΟΓΙ

A - ΤΡΟΠΟΙ

ΧΟΡΗΓΗΣ

ΗΣ:

Μία σταγόνα ενσταλάζεται 4 φορές την ημέρα ή και συχνότερα, στο σάκο του επιπεφυκότα ή όπως απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού προκειμένου να ανακουφιστούν τα συμπτώματα.

Κρατήστε το σωληνάριο κάθετα προς τον πάσχοντα οφθαλμό, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, έτσι ώστε η σταγόνα του THIOLOGEL® να

πέφτει με τη βοήθεια της βαρύτητας. Αυτή η τεχνική παρέχει ομοιόμορφο μέγεθος σταγόνας, που συμφωνεί με τις θεραπευτικές απαιτήσεις εμποδίζοντας σχηματισμούς σταγόνων που υπερβαίνουν το σάκο του επιπεφυκότα και αποφεύγεται το κόλλημα των βλεφαρίδων. Το THIOLOGEL μπορεί να χρησιμοποιείται για θεραπεία μακράς διάρκειας.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ-ΦΥΛΑΞΗ:

Το THIOLOGEL δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25° C. Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 28 ημέρες μετά το πρώτο άνοιγμα του σωληναρίου τυχόν υπόλειμμα να απορρίπτεται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Σ
ω
λ
η
ν
ά
ρ
ι
ο

α
λ
ο
υ
μ
ι
ν
ί
ο
υ

μ
ε

ε
π
έ
ν
δ
υ
σ
η

π
ο
λ
υ
α
ι
θ
υ
λ
ε
ν
ί
ο
υ
.

Π
λ

α
σ
τ
ι
κ
ό

π
ώ
μ
α

π
ο
λ
υ
α
ι
θ
υ
λ
ε
ν
ί
ο
υ
·

Π
ε
ρ
ι
έ
χ
ε
ι

1
0

g

Υ
έ
λ
η
ς
·

Φαρμακευτικό προϊόν για το
οποίο δεν απαιτείται ιατρική
συνταγή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
SA ALCON-COUVREUR NV-
ΒΕΛΓΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ
ΑΕΒΕ
Κηφισίας 18, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.:
210 6800811-12

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

6926/2-2-2006 Τηλ. Κέντρου

Δηλητηριάσεων: 2107793777

© 2007 Alcon, Inc.