

GAP

G.A.Pharmaceuticals S.A.

SALMON OIL - GAP

Ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύνθεση

Δραστική ουσία: πολυακόρεστα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (Omega-3 polyunsaturated fatty acids): Eicosapentaenoic acid (EPA), Docosahexaenoic acid (DHA) και Docosapentaenoic acid (DPA).

Έκδοχα: dl-α-tocopheryl acetate, gelatin, glycerol & methylparaben.

Φαρμακοτεχνική μορφή: Καψάκια μαλακά.

Περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες: Κάθε κάψουλα SALMON OIL - GAP περιέχει 500mg ιχθυελαίου, το οποίο περιέχει τα ακόλουθα πολυακόρεστα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: EPA 17%, DHA 10% και DPA 3%.

Περιγραφή - Συσκευασία: Διάφανες μαλακές κάψουλες ζελατίνας που περιέχουν ιχθυέλαιο κιτρινωπού χρώματος. Κουτιά των 50 καψουλών σε αεροστεγή συσκευασία [5 blisters (αλουμινίου/PVC) των 10 καψουλών].

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (EPA, DHA & DPA).

Υπεύθυνος κυκλοφορίας & παρασκευαστής: GAP A.E.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο φάρμακο που σας χορήγησε ο γιατρός σας, το SALMON OIL - GAP. Παρακαλούμε διαβάστε τις προσεκτικά. Θα σας δώσουν σημαντικές πληροφορίες αλλά δεν μπορούν να σας τα εξηγήσουν όλα. Εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις, ή δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Γενικές πληροφορίες

Το SALMON OIL - GAP είναι συμπυκνωμένο ιχθυέλαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα της σειράς των ω-3 και συγκεκριμένα σε εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) και εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA). Η τακτική συνεχής λήψη του SALMON OIL - GAP στη δίαιτα οδηγεί σε παρατεταμένη μείωση των τριγλυκεριδίων στο αίμα.

Ενδείξεις

Το SALMON OIL - GAP χρησιμοποιείται σε ασθενείς στους οποίους είναι επιθυμητή η μείωση των τριγλυκεριδίων στο αίμα, σε συνδυασμό με κατάλληλη δίαιτα.

Αντενδείξεις

Αλλεργία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του. Σε ασθενείς με άσθμα ευαίσθητους στην ασπιρίνη.

Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά την χρήση

- **Γενικά:** Πριν πάρετε το φάρμακό σας, ενημερώστε το γιατρό σας εάν εμφανίζετε αιματολογικές διαταραχές, όπως αιμορροφιλία ή αν λαμβάνετε αντιπηκτικά φάρμακα ή άλλα φάρμακα που επηρεάζουν την πήξη του αίματος. Υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι τα προϊόντα που περιέχουν ιχθυέλαιο μπορεί να προκαλέσουν κρίση βρογχόσπασμου σε ασθενείς με άσθμα ευαίσθητο στην ασπιρίνη.
Δόσεις SALMON OIL - GAP άνω των 5g/ημέρα μπορεί να προκαλέσουν μικρή επιδείνωση στον έλεγχο της γλυκόζης σε μη ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς ασθενείς. Να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου II.
- **Ηλικιωμένοι:** Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις.
- **Κύηση:** Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση του SALMON OIL - GAP κατά την κύηση, γι' αυτό η χρήση του αντενδείκνυται σε αυτή την περίπτωση.
- **Γαλουχία:** Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση του SALMON OIL - GAP κατά την κύηση, γι' αυτό η χρήση του αντενδείκνυται στην περίπτωση αυτή.
- **Παιδιά:** Η χρήση των ιχθυελαίων δεν έχει τεκμηριωθεί στα παιδιά.
- **Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:** Δεν φαίνεται να επιδρά.
- **Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα:** Καμία.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες

Πριν πάρετε το φάρμακό σας, ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αγοράσατε χωρίς συνταγή γιατρού. Ειδικά, ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε αντιπηκτικά ή άλλα φάρμακα που επηρεάζουν την πήξη του αίματος όπως ασπιρίνη, κεφαλοσπορίνες.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

- Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας για το πότε και πως να παίρνετε το φάρμακό σας.
Παρακαλούμε **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ** που αναγράφονται στον περιέκτη. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν δεν είστε σίγουροι.
- Ενήλικες & Ηλικιωμένοι: 5 κάψουλες από το στόμα δύο φορές την ημέρα κατά την διάρκεια του γεύματος.

Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση

Το SALMON OIL - GAP αποτελείται εξ ολοκλήρου από συστατικά που περιλαμβάνονται σε μία κανονική διατροφή και θεωρείται αβλαβές στη συνιστώμενη δοσολογία. Επιβλαβείς επιδράσεις λόγω υπερδοσολογίας είναι απίθανο να εμφανιστούν.

Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψετε κάποια δόση:

Παίρνετε το SALMON OIL - GAP σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Ωστόσο, εάν παραλείψετε μια δόση, μην πάρετε μια επιπλέον δόση για να την αναπληρώσετε. Συνεχίστε το κανονικό σας πρόγραμμα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε ορισμένους ασθενείς έχει αναφερθεί διάρροια, παροδική ναυτία και ερυγές (ρέψιμο).
Στις ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται επίσης δυσπεψία, κεφαλαλγία και σε σποραδικές περιπτώσεις μικρή μείωση της αρτηριακής πίεσης του αίματος.
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει αναφερθεί μικρή αύξηση της γλυκόζης του αίματος.

Ημερομηνία λήξης του προϊόντος

Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος

Το SALMON OIL - GAP φυλάσσεται σε δροσερές συνθήκες, 8° - 15°C.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών: 11/2001.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
- Διατηρείτε τα φάρμακα στον αρχικό περιέκτη τους.
- Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει να σταματήσετε τη θεραπεία, καταστρέψτε το υπόλοιπο φάρμακο.
- Μην παίρνετε τα φάρμακα μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον περιέκτη. Καταστρέψτε τα.
- Φυλάξτε τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος όπου τα παιδιά δεν μπορούν να τα δουν ή να τα φτάσουν. Τα φάρμακα σας μπορεί να βλάψουν τα παιδιά.

Τρόπος διάθεσης: με ιατρική συνταγή

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. 6246/15.2.95

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα από τη Φαρμακοβιομηχανία

GAP A.E.

Αγησιλαού 46, 173 41 - Αθήνα

Τηλ. 2109310980-4

Fax: 2109338759