

**TRAVELGUM® 20 mg
Dimenhydrinate 20mg
Φαρμακευτικό μασώμενο κόμμα (Τσίκλα)
10 ΤΣΙΚΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε φαρμακευτικό μασώμενο κόμμα (τσίκλα) περιέχει:

Δραστική ουσία: Dimenhydrinate

Έκδοχα: Eudragit S, Chewing Gum Base, Dextrin, Aspartame, Saccharin Sodium, Peppermint Flavor, Magnesium oxide light, Sorbitol, Sucrose, Witepsol E85, Wax, Menthol, Silicon dioxide colloidal (Aerosil 200), Talc, Magnesium stearate.

Επικάλυψη: Eudragit E, Magnesium stearate, Sucrose, Polyvidone 25, Macrogol, Dextrose (Glucose) liquid, Potassium phosphate monobasic, Calcium carbonate, Titanium dioxide E171 CI 77891, Talc, Peppermint flavor, Menthol, Wax E.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η διμενυδρινάτη είναι ένα αντιισταμινικό το οποίο έχει μια ειδική ικανότητα να αντιστρέφει τη ναυτία και τον έμετο. Το σημείο της δράσης της είναι στις νευρικές οδούς του αιθουσαίου συστήματος (αιθουσαίους νευρώνες). Κατά τη μάσηση το δραστικό συστατικό απελευθερώνεται και απορροφάται απευθείας στην αιματική κυκλοφορία μέσω του στοματικού βλεννογόνου.

Με αυτού του είδους τη στοματική χορήγηση υπάρχει ένα καθαρό πλεονέκτημα κατά τα ταξίδια και για τα παιδιά, σε σχέση με άλλα φάρμακα που πρέπει να καταπίνονται.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το TRAVELGUM είναι αποτελεσματικό ακόμη και μετά την εκδήλωση του εμέτου και της ναυτίας. Έτσι το TRAVELGUM είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την πρόληψη της ναυτίας των ταξιδιωτών.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ναυτία των ταξιδιωτών (ναυτία και έμετος λόγω του ταξιδιού με αυτοκίνητο, τρένο, αεροπλάνο ή πλοίο).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Ακολουθείστε προσεκτικά τις δοσολογίες που αναφέρονται στη συνέχεια, εκτός αν έχει συνταγογραφηθεί από το γιατρό.

Άτομα ιδιαίτερα ευαίσθητα στη ναυτία των ταξιδιωτών, θα πρέπει να μασούν 15 έως 30 λεπτά περίπου πριν από το ταξίδι 1 τσίκλα TRAVELGUM επί 10 λεπτά. Σε περίπτωση που εμφανιστούν τα συμπτώματα από τη ναυτία του ταξιδιού, μία δεύτερη τσίκλα θα πρέπει να μασηθεί με την εμφάνιση των πρώτων σημείων.

Σε περιπτώσεις όπου η ναυτία των ταξιδιωτών δεν έχει εκδηλωθεί στο παρελθόν, το TRAVELGUM θα πρέπει να μασηθεί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (ναυτία, έμετος). Εάν λαμβάνονται ημερησίως περισσότερες από 6 έως 7 τσίκλες, κόπωση ή άλλες παρενέργειες μπορεί να εκδηλωθούν πιο έντονα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Υπερευαισθησία σ' ένα από τα συστατικά. Ασθενείς με φαινυλκετονουρία (λόγω του συστατικού ασπαρτάμη). Γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Συμπτωματική υπερτροφία προστάτου. Οξεία ασθματική κρίση, στένωση του γαστρεντερικού σωλήνα ή του αυχένα της χοληδόχου κύστης, στένωση του λεπτού εντέρου, κατά τη διάρκεια θεραπείας και 1 έως 2 εβδομάδες μετά τη θεραπεία με αναστολείς της ΜΑΟ (αντικαταθλιπτικούς παράγοντες).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Προσοχή απαιτείται σε περίπτωση σπασμών (επιληψία, εκλαμψία) και ανεπάρκεια γλυκοζο-6-φωσφορικής δεϋδρογονάσης. Η διάγνωση σε περιπτώσεις εγκεφαλικού όγκου, θα μπορούσε να είναι πιο δύσκολη.

Κύηση και γαλουχία

Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την περίοδο της κύησης και της γαλουχίας. Σε περίπτωση κύησης παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συνήθως: υπνηλία, ξηρότητα στοματικού βλεννογόνου.

Σποραδικά: ανησυχία, νευρικότητα, αϋπνία (ιδιαίτερα για τα παιδιά), πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Περιστασιακά: ενοχλήσεις στο γαστρεντερικό σωλήνα, διαταραχές της όρασης, ενοχλήσεις κατά τη διούρηση, ίλιγγος/ζάλη, πονοκέφαλος, μυϊκή αδυναμία, αταξία των συντονισμένων κινήσεων (ιδιαίτερα σε υψηλότερη δοσολογία). Σε περίπτωση υπερευαισθησίας μπορεί να εμφανιστούν δερματικές αντιδράσεις (υψηλότερη φωτοευαισθησία του δέρματος).

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Κατά τη χορήγηση της τσίκλας TRAVELGUM 20 mg η αποτελεσματικότητα άλλων φαρμάκων τα οποία λαμβάνονται ταυτόχρονα μπορεί να ενταθεί.

- Υπνωτικά, ηρεμιστικά.

- Αντιχολινεργικά (π.χ. αντιπαρκινσονικά, αντικαταθλιπτικά).

Το αλκοόλ ενισχύει την κατασταλτική δράση του φαρμάκου.

Μπορεί να συγκαλύψει τα συμπτώματα της ωτοτοξικότητας ορισμένων αντιβιοτικών.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε ταυτόχρονη θεραπεία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Η διμενυδρινάτη μπορεί να μειώσει την ικανότητα αντίδρασης λόγω της ελαφρώς ηρεμιστικής της επίδρασης κι επομένως απαιτείται προσοχή κατά την οδήγηση ή χρήση μηχανημάτων.

Σημείωση για διαβητικούς: Μία τσίκλα περιέχει 0,476 g ζάχαρης (αντιστοιχούν σε 0,04 BU).

Το προϊόν περιέχει ασπαρτάμη: η περιεκτικότητα ασπαρτάμης που μπορεί να λαμβάνεται ανά ημέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 mg/kg βάρους σώματος. Απαγορεύεται η λήψη του προϊόντος από ασθενείς που πάσχουν από

φαινυλκετονουρία.

Οι τσίκλες TRAVELGUM δεν πρέπει να καταπίνονται γιατί κάτι τέτοιο θα επιδεινώνε τη ναυτία. Ωστόσο είναι αβλαβής η ακούσια κατάποση της τσίκλας.

Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν και δεν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα απαιτείται ιατρική συμβουλή το συντομότερο δυνατόν.

Με το πρώτο σημείο παρενεργειών ή σε περίπτωση κύησης παρακαλείσθε να αποτανθείτε στο γιατρό σας.

Το προϊόν φυλάσσεται σε θερμοκρασία $\leq 30^{\circ}\text{C}$.

Ενημερωθείτε για την ημερομηνία λήξης.

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Σε περίπτωση σύγχυσης ζητείστε επαγγελματική συμβουλή.

Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 28596/8-7-2010

Προϊόν της HERMES PHARMA Ges.m.b.H., Αυστρία

Παρασκευαστής: HERMES PHARMA Ges.m.b.H., Wolfsberg, Αυστρία

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: BIANEΞ A.E. – Οδός Τατοΐου 146 71 Νέα Ερυθραία, Τηλ. 210 8009111-120

Διανομέας: BIAN A.E., Τηλ. 210 9883985, 210 9883372