

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

**MOXICLAV 125 mg/31.25 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα**  
**MOXICLAV 250 mg/62.50 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα**

### Αμοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ

**Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χορηγείτε στο παιδί σας αυτό το φάρμακο.**

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό, ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για το μωρό ή το παιδί σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με του παιδιού σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

**Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:**

- 1 Τι είναι το **MOXICLAV** και ποια είναι η χρήση του
- 2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το **MOXICLAV**
- 3 Πώς να πάρετε το **MOXICLAV**
- 4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
- 5 Πώς να φυλάσσεται το **MOXICLAV**
- 6 Λοιπές πληροφορίες

### 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MOXICLAV ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το **MOXICLAV** είναι ένα αντιβιοτικό και δρα σκοτώνοντας τα βακτηρίδια που προκαλούν τις λοιμώξεις. Περιέχει δύο διαφορετικά φάρμακα που ονομάζονται αμοξικιλίνη και κλαβουλανικό οξύ. Η αμοξικιλίνη ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται «πενικιλίνες» η δράση των οποίων μερικές φορές μπορεί να εμποδιστεί (αδρανοποιείται). Το άλλο δραστικό συστατικό (κλαβουλανικό οξύ) δεν επιτρέπει να συμβεί αυτό.

Το **MOXICLAV** χρησιμοποιείται σε μωρά και παιδιά για τη θεραπεία των παρακάτω λοιμώξεων:

Κόνις για πόσιμο εναιώρημα 125 mg/31.25 mg/5 ml και κόνις για πόσιμο εναιώρημα 250 mg/62.50 mg/5 ml.

- λοιμώξεις του μέσου ωτός και παραρρινοκολπίτιδα
- λοιμώξεις του αναπνευστικού
- λοιμώξεις του ουροποιητικού
- λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων περιλαμβανομένων των οδοντιατρικών λοιμώξεων
- λοιμώξεις των οστών και των αρθρώσεων

## 2. ΠΡΙΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΤΟ MOXICLAV

### **Μην χορηγήσετε στο παιδί σας το MOXICLAV:**

- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην αμοξικιλίνη, το κλαβουλανικό οξύ ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του **MOXICLAV** (αναφέρονται στην παράγραφο 6)
- σε περίπτωση που είχε ποτέ σοβαρή αλλεργική αντίδραση (υπερευαισθησία) σε οποιοδήποτε άλλο αντιβιοτικό. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει δερματική αντίδραση ή πρήξιμο του προσώπου ή του λαιμού.
- σε περίπτωση που είχε ποτέ ηπατικά προβλήματα ή ίκτερο (κιτρίνισμα του δέρματος) όταν έπαιρνε κάποιο αντιβιοτικό

→ **Μην χορηγήσετε στο παιδί σας MOXICLAV εάν κάποιο από τα παραπάνω αφορά το παιδί σας.** Εάν δεν είστε σίγουροι, μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν χορηγήσετε το **MOXICLAV**.

### **Προσέξτε ιδιαίτερα με το MOXICLAV**

Μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν χορηγήσετε στο παιδί σας αυτό το φάρμακο, εάν:

- έχει πυρετό με διογκωμένους λεμφαδένες
- κάνει θεραπεία για νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα
- δεν ουρεί τακτικά

Εάν δεν είστε σίγουροι, εάν κάποιο από τα παραπάνω αφορά το παιδί σας, μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν χορηγήσετε το **MOXICLAV**.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο γιατρός σας μπορεί να διερευνήσει το είδος του βακτηριδίου που προκαλεί τη λοίμωξη στο παιδί σας. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, μπορεί να χορηγηθεί στο παιδί σας διαφορετική περιεκτικότητα **MOXICLAV** ή διαφορετικό φάρμακο.

### **Καταστάσεις που μπορεί να χρειαστεί να προσέξετε**

Το **MOXICLAV** μπορεί να επιδεινώσει ορισμένες καταστάσεις, ή να προκαλέσει σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές περιλαμβάνουν αλλεργικές αντιδράσεις, επιληπτικές κρίσεις (σπασμοί) και φλεγμονή του παχέος εντέρου. Πρέπει να κοιτάξετε για συγκεκριμένα συμπτώματα κατά τη διάρκεια λήψης του **MOXICLAV** από το παιδί σας, για να μειώσετε τον κίνδυνο οποιωνδήποτε προβλημάτων. Βλέπε «Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε» στην **Παράγραφο 4**.

### **Εξετάσεις αίματος και ούρων**

Εάν το παιδί σας κάνει εξετάσεις αίματος (όπως εξετάσεις για την κατάσταση των ερυθρών αιμοσφαιρίων ή εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας) ή εξετάσεις ούρων (για τη γλυκόζη), ενημερώστε το γιατρό ή το νοσηλευτή ότι παίρνει το **MOXICLAV**. Αυτό γιατί το **MOXICLAV** μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα αυτού του τύπου των εξετάσεων.

### **Χρήση άλλων φαρμάκων**

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό, ή το φαρμακοποιό σας εάν το παιδί σας παίρνει ή έχει πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα. Αυτά περιλαμβάνουν και φάρμακα που μπορούν να αγοραστούν χωρίς συνταγή και φάρμακα φυτικής προέλευσης.

Εάν το παιδί σας λαμβάνει αλλοπουρινόλη (χρησιμοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) με MOXICLAV, μπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα να εμφανίσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Εάν το παιδί σας λαμβάνει προβενεσίδη (χρησιμοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει τη ρύθμιση της δόσης του MOXICLAV.

Εάν λαμβάνονται αντιπηκτικά φάρμακα (όπως η βαρφαρίνη) μαζί με MOXICLAV τότε μπορεί να χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις αίματος.

Το MOXICLAV μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης της μεθοτρεξάτης (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου ή των ρευματικών παθήσεων).

### **Κύηση και θηλασμός**

Εάν το παιδί σας που πρόκειται να πάρει αυτό το φάρμακο, είναι έγκυος ή εάν θηλάζει, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

### **Σημαντική πληροφορία σχετικά με ορισμένα συστατικά του MOXICLAV**

## **3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΤΟ MOXICLAV**

Πάντοτε να χορηγείται το MOXICLAV αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

### **Ενήλικοι και παιδιά βάρους 40 kg και άνω**

- Αυτό το εναιώρημα συνήθως δεν συνιστάται για ενήλικες και παιδιά βάρους 40 kg και άνω. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

### **Παιδιά βάρους μικρότερου των 40 kg**

Όλες οι δόσεις έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το βάρος σώματος του παιδιού σε χιλιόγραμμα.

- Ο γιατρός σας θα σας συμβουλέψει πόσο MOXICLAV θα πρέπει να χορηγήσετε στο μωρό ή στο παιδί σας.

125 mg/31.25 mg/5 ml και 250 mg/62.50 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα.

- Μπορεί να παρέχεται πλαστικό κουτάλι ή κύπελο μέτρησης. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε για να χορηγήσετε τη σωστή δόση στο μωρό ή στο παιδί σας.
- Συνήθης δόση – 20 mg/5mg έως 60 mg/15 mg για κάθε χιλιόγραμμο βάρους σώματος την ημέρα, χορηγούμενο σε τρεις διηρημένες δόσεις.

### **Ασθενείς με ηπατικά και νεφρικά προβλήματα**

- Εάν το παιδί σας έχει νεφρικά προβλήματα, η δόση μπορεί να μειωθεί. Ο γιατρός σας μπορεί να επιλέξει μία διαφορετική περιεκτικότητα ή διαφορετικό φάρμακο.
- Εάν το παιδί σας έχει ηπατικά προβλήματα μπορεί να χρειαστούν συχνότερες εξετάσεις αίματος για τον έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας.

### **Πώς να χορηγήσετε το MOXICLAV**

- Πάντοτε να ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση.
- Χορηγήστε το φάρμακο στην αρχή ενός γεύματος ή αμέσως πριν.
- Διαχωρίστε τις δόσεις ισοδύναμα κατά τη διάρκεια της ημέρας με τουλάχιστον 4ωρα διαστήματα. Μην πάρετε 2 δόσεις σε 1 ώρα.
- Μην χορηγήσετε στο παιδί σας το MOXICLAV για περισσότερο από 2 εβδομάδες. Εάν το παιδί σας εξακολουθεί να αισθάνεται άρρωστο πρέπει να ξαναεπισκεφθείτε το γιατρό σας.

### **Εάν χορηγήσετε μεγαλύτερη δόση MOXICLAV από την κανονική**

Εάν χορηγήσετε μεγαλύτερη ποσότητα MOXICLAV, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν διαταραχή στο στομάχι (αίσθημα αδιαθεσίας ή διάρροια) ή σπασμούς. Μιλήστε με το γιατρό σας το συντομότερο δυνατόν. Δείξτε στο γιατρό τη φιάλη του φαρμάκου.

### **Εάν ξεχάσετε να χορηγήσετε το MOXICLAV**

Εάν ξεχάσετε να χορηγήσετε στο παιδί σας μία δόση, χορηγήστε την αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Δεν πρέπει να χορηγήσετε στο παιδί σας την επόμενη δόση πολύ κοντά, αλλά να περιμένετε περίπου 4 ώρες πριν χορηγήσετε την επόμενη δόση.

### **Εάν το παιδί σας σταματήσει να παίρνει το MOXICLAV**

Συνεχίστε να χορηγείτε στο παιδί σας το MOXICLAV μέχρι να τελειώσει η θεραπευτική αγωγή, ακόμα και αν αισθάνεται καλύτερα. Το παιδί σας χρειάζεται όλες τις δόσεις ώστε να αντιμετωπίσει τη λοίμωξη. Εάν επιζήσουν κάποια βακτηρίδια μπορεί να επαναφέρουν τη λοίμωξη.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

## **4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το MOXICLAV μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Με αυτό το φάρμακο μπορεί να εμφανισθούν οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες.

### **Καταστάσεις που χρειάζεται να προσέξετε**

#### **Αλλεργικές αντιδράσεις:**

- δερματικό εξάνθημα
- φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων (*αγγειίτιδα*) που μπορεί να είναι φαίνεται σαν κόκκινες ή μωβ εξογκωμένες κηλίδες στο δέρμα, αλλά μπορεί να προσβληθούν και άλλα μέρη του σώματος
- πυρετός, πόνος στις αρθρώσεις, πρήξιμο στους αδένες του λαιμού, της μασχάλης ή της βουβωνικής χώρας

- οίδημα, ορισμένες φορές στο πρόσωπο ή στο στόμα (*αγγειοοίδημα*), που προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή
- κατάρρευση

→ **Επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας** εάν το παιδί σας εμφανίσει κάποιο από αυτά τα συμπτώματα. **Σταματήστε τη λήψη του MOXICLAV.**

#### **Φλεγμονή του παχέος εντέρου**

Φλεγμονή του παχέος εντέρου, που προκαλεί υδαρή διάρροια συνήθως με αίμα και βλένη, πόνο στο στομάχι και/ή πυρετό.

→ **Συμβουλευτείτε το γιατρό σας το συντομότερο δυνατόν** εάν ο παιδί σας εμφανίσει αυτά τα συμπτώματα.

#### **Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες**

Αυτές μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα

- διάρροια (στους ενήλικες).

#### **Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες**

Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα

- άφθα (*κάντιντα* – μυκητιασική λοίμωξη του κόλπου, του στόματος ή των δερματικών πτυχών)
  - αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία), ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται υψηλές δόσεις
- εάν σας επηρεάσει πάρτε το MOXICLAV πριν από το φαγητό
- έμετος
  - διάρροια (στα παιδιά)

#### **Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες**

Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα

- δερματικό εξάνθημα, φαγούρα
- εξογκωμένο κνησμώδες εξάνθημα (*κνίδωση*)
- δυσπεψία
- ζάλη
- πονοκέφαλος

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίματος:

- αύξηση ορισμένων ουσιών (*ένζυμα*) που παράγονται από το ήπαρ.

#### **Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες**

Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1000 άτομα

- δερματικό εξάνθημα, που μπορεί να έχει φουσκάλες και να μοιάζει με μικρούς στόχους (σκουρόχρωμες κεντρικές κηλίδες που περιβάλλονται από μία ανοιχτόχρωμη περιοχή με μαύρο δακτύλιο γύρω από τις άκρες – *πολύμορφο ερύθημα*)
- εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα επικοινωνήστε με ένα γιατρό επειγόντως

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να φανούν στις εξετάσεις αίματος:

- χαμηλός αριθμός κυττάρων που εμπλέκονται στην πήξη του αίματος
- χαμηλός αριθμός λευκοκυττάρων

## Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν φανεί σε ένα πολύ μικρό αριθμό ατόμων αλλά η ακριβής συχνότητά τους είναι άγνωστη.

- Αλλεργικές αντιδράσεις (βλέπε παραπάνω)
  - Φλεγμονή του παχέος εντέρου (βλέπε παραπάνω)
  - Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις:
    - εκτεταμένο εξάνθημα με φουσκάλες και αποφλοιωμένο δέρμα, ιδιαίτερα γύρω από το στόμα, τη μύτη, τα μάτια και τα γεννητικά όργανα (*σύνδρομο Stevens-Johnson*) και μία σοβαρότερη μορφή που προκαλεί εκτεταμένη αποφλοιώση του δέρματος (περισσότερο από 30% της επιφάνειας του σώματος – *τοξική επιδερμική νεκρόλυση*)
    - εκτεταμένο κόκκινο δερματικό εξάνθημα με μικρές φουσκάλες που περιέχουν πύον (*αποφολιδωτική δερματίτιδα*)
    - κόκκινο με απολέπιση εξάνθημα, με σβώλους κάτω από το δέρμα και φουσκάλες (*βλατιδώδες εξάνθημα*)
- **Επικοινωνήστε με ένα γιατρό αμέσως εάν το παιδί σας εμφανίσει κάποια από αυτά τα συμπτώματα.**

- φλεγμονή του ήπατος (*ηπατίτιδα*)
- ίκτερος, που προκαλείται από αύξηση της χολερυθρίνης στο αίμα (μιας ουσίας που παράγεται στο ήπαρ) που μπορεί να κάνει το δέρμα και το λευκό των ματιών του παιδιού σας να φαίνονται κίτρινα
- φλεγμονή των νεφρικών σωληναρίων
- το αίμα αργεί να πήξει
- υπερκινητικότητα
- σπασμοί (σε άτομα που παίρνουν υψηλές δόσεις MOXICLAV ή έχουν νεφρικά προβλήματα)
- μελανή γλώσσα που μοιάζει τριχωτή
- κηλίδες στα δόντια (στα παιδιά), συνήθως απομακρύνονται με το βούρτσισμα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες που φαίνονται στις εξετάσεις αίματος ή ούρων:

- σοβαρή μείωση του αριθμού των λευκοκυττάρων
- χαμηλός αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων (*αιμολυτική αναιμία*)
- κρύσταλλοι στα ούρα.

## Εάν το παιδί σας εμφανίσει ανεπιθύμητες ενέργειες

→ **Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας** εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται **σοβαρή**, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών.

## 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ MOXICLAV

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το MOXICLAV μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα

σκουπίδια.

Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

## 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Τι περιέχει το MOXICLAV

Τα δραστικά συστατικά είναι: amoxicillin (αμοξικιλίνη) με τη μορφή τριϋδρικού άλατος και clavulanic acid (κλαβουλανικό οξύ) με τη μορφή καλιούχου άλατος

Η σκόνη για πόσιμο εναιώρημα που χορηγείται συνήθως στα παιδιά διατίθεται σε δύο περιεκτικότητες:

Moxiclav κόνις για πόσιμο εναιώρημα 156.25 mg/5ml: Κάθε κουταλάκι (5 ml) περιέχει 125 mg amoxicillin και 31.25 mg clavulanic acid. Ως αδρανή συστατικά περιέχει κόμμι ξανθάνης, υδροξυ-προπυλο-μεθυλο-κυτταρίνη, διοξείδιο του πυριτίου, σακχαρίνη νατριούχος, ηλεκτρικό οξύ, άρωμα φράουλα, λεμόνι και ροδάκινο.

Moxiclav forte εναιώρημα 312.5 mg/5ml: Κάθε κουταλάκι (5 ml) περιέχει 250 mg amoxicillin και 62.5 mg clavulanic acid. Ως αδρανή συστατικά περιέχει κόμμι ξανθάνης, υδροξυ-προπυλο-μεθυλο-κυτταρίνη, διοξείδιο του πυριτίου, σακχαρίνη νατριούχος, ηλεκτρικό οξύ, άρωμα φράουλα, λεμόνι και ροδάκινο.

### Εμφάνιση του MOXICLAV και περιεχόμενο της συσκευασίας

Η κόνις για πόσιμο εναιώρημα Moxiclav βρίσκεται σε γυάλινα μπουκάλια και μετά την ανασύσταση δίνει 60ml εναιωρήματος.

**Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: Medochemie Hellas A.E.,  
Παστέρ 6, 115 21 Αθήνα, τηλ.: 210-6413160**

**Παραγωγός :** Medochemie Ltd, Εργοστάσιο Β, Λεμεσός  
Κύπρος

**Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:**

**Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις:**

Τρόπος διάθεσης: με ιατρική συνταγή

### Οδηγίες για την ανασύσταση

125 mg/31.25 mg/5ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα

Ελέγχεται ότι το σφράγισμα είναι άθικτο πριν από τη χρήση. Ανακινείτε τη φιάλη για να ξεκολλήσει η κόνις. Προσθέστε νερό (όπως ενδείκνυται παρακάτω), αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. Εναλλακτικά γεμίστε τη φιάλη με νερό μέχρι λίγο παρακάτω από τη χαραγή στην ετικέτα της φιάλης, αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. Στη συνέχεια γεμίστε με νερό ακριβώς μέχρι τη χαραγή, αναστρέψτε και πάλι ανακινήστε καλά.

Περιεκτικότητα	Όγκος νερού που πρέπει	Τελικός όγκος
----------------	------------------------	---------------

	να προστεθεί για την ανασύσταση (ml)	ανασυσταμένου λαμβανόμενου από το στόμα εναιωρήματος (ml)
125 mg/31.25 mg/5ml	Συμπλήρωμα έως το σημάδι	60

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση.

250 mg/62.50 mg/5ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα

Ελέγχεται ότι το σφράγισμα είναι άθικτο πριν από τη χρήση. Ανακινείτε τη φιάλη για να ξεκολλήσει η κόνις. Προσθέστε νερό (όπως ενδείκνυται παρακάτω), αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. Εναλλακτικά γεμίστε τη φιάλη με νερό μέχρι λίγο παρακάτω από τη χαραγή στην ετικέτα της φιάλης, αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. Στη συνέχεια γεμίστε με νερό ακριβώς μέχρι τη χαραγή, αναστρέψτε και πάλι ανακινήστε καλά.

Περιεκτικότητα	Όγκος νερού που πρέπει να προστεθεί για την ανασύσταση (ml)	Τελικός όγκος ανασυσταμένου λαμβανόμενου από το στόμα εναιωρήματος (ml)
250 mg/62.50 mg/5ml	Συμπλήρωμα έως το σημάδι	60

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση.

### Συμβουλή/ιατρική εκπαίδευση

Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτηρίδια. Δεν είναι αποτελεσματικά έναντι των λοιμώξεων που προκαλούνται από ιούς.

Ορισμένες φορές μία λοίμωξη που προκαλείται από βακτηρίδια δεν ανταποκρίνεται σε ένα σχήμα αντιβιοτικού. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους γι' αυτό, είναι επειδή τα βακτηρίδια που προκαλούν τη λοίμωξη είναι ανθεκτικά στο λαμβανόμενο αντιβιοτικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιζήσουν και ακόμα να πολλαπλασιαστούν παρά το αντιβιοτικό.

Όταν ο γιατρός σας χορηγήσει ένα σχήμα αντιβιοτικού, αυτό προτίθεται να θεραπεύσει μόνο την τρέχουσα πάθησή σας. Η εφαρμογή των παρακάτω συμβουλών θα βοηθήσει στην πρόληψη εμφάνισης ανθεκτικών βακτηριδίων που μπορούν να εμποδίσουν τη δράση του αντιβιοτικού.

1. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνετε το αντιβιοτικό στη σωστή δόση, τη σωστή ώρα και για το σωστό αριθμό ημερών. Διαβάστε τις οδηγίες στην επισήμανση και εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό να σας το εξηγήσει.
2. Δεν πρέπει να πάρετε ένα αντιβιοτικό εκτός εάν έχει συνταγογραφηθεί ειδικά για σας και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε μόνο για την αντιμετώπιση της



λοιμώξης για την οποία σας χορηγήθηκε.

3. Δεν πρέπει να πάρετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε άλλα άτομα ακόμα κι αν είχαν λοίμωξη που ήταν παρόμοια με τη δική σας.
4. Δεν πρέπει να δίνετε αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε σας σε άλλα άτομα.
5. Εάν έχετε κάποιο αντιβιοτικό που έμεινε μετά τη λήψη του σχήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας, θα πρέπει να επιστρέψετε το υπόλοιπο στο φαρμακείο για να απορριφθεί καταλλήλως.