

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1 Ονομασία: CEFACLORIL

1.2 Σύνθεση:

α) Κάψουλες

Δραστική Ουσία: Μονοϋδρικό άλας της κεφακλόρης

Έκδοχα: Lactose Monohydrate, Pregelatinised Starch, Magnesium Stearate

Σύνθεση κενής κάψουλας No 0 White (body 60%)-Dark green (cap40%): Indigocarmine-FD & C Blue 2, E132, Quinoline Yellow E104, CI 47005, Titanium dioxide E171, CI 77891, Water, Gelatin

β) Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα

Δραστική Ουσία: Μονοϋδρικό άλας της κεφακλόρης

Έκδοχα: Sodium Lauryl sulfate (purified), Emulsion silicone 30%, Erythrosine E127, CI 45430, Methylcellulose 15, Xanthan gum, Pregelatinised maize starch, Strawberry, Sucrose.

1.3 Φαρμακοτεχνικές μορφές

Υπάρχουν οι ακόλουθες δύο (2) φαρμακοτεχνικές μορφές:

α) Κάψουλες

β) Κοκκία για παρασκευή πόσιμου εναιωρήματος

1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία

α) Κάψουλες

- Κάψουλες των 500 mg κεφακλόρης

β) Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα

- Κοκκία για παρασκευή πόσιμου εναιωρήματος 500 mg κεφακλόρης/ 5 ml.

1.5 Περιγραφή-Συσκευασία

α) Κάψουλες των 500 mg

Η χάρτινη εξωτερική συσκευασία περιέχει 12 σκληρές κάψουλες χρώματος λευκού-πράσινου, σε 3 blisters των 4 καψουλών το καθένα.

β) Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα 500 mg/5 ml. Η χάρτινη εξωτερική συσκευασία περιέχει γυάλινο διαφανές φιαλίδιο χωρητικότητας 60 ml, που περιέχει μικρά κοκκία (σκόνη) για ανασύσταση στα 60 ml.

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία

Αντιβιοτικό

1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ALAPIS A.B.E.E

Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 17671 Αθήνα

Τηλ: 2130151111, Fax: 2109238456

1.8 Παρασκευαστής/Συσκευαστής: REMEDINA A.B.E.E.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

2.1 Γενικές πληροφορίες

Το Cefaclor είναι αντιβιοτικό το οποίο ανήκει στην ομάδα των ημισυνθετικών κεφαλοσπορινών 2^{ης} γενιάς και προορίζεται για από του στόματος χορήγηση.

2.2 Ενδείξεις

Το Cefaclor ενδείκνυται στην θεραπεία των ακόλουθων λοιμώξεων, όταν αυτές προκαλούνται από τα αναφερόμενα κατωτέρω στελέχη μικροοργανισμών, εφόσον είναι ευαίσθητα σε αυτό:

Μέση πυώδης ωτίτιδα προκαλούμενη από *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *Staphylococci* (εξαιρουμένων των στελεχών που είναι ανθεκτικά στη μεθικιλίνη), *S.pyogenes* (β-αιμολυτικός Στρεπτόκοκκοι ομάδας A) και *M.catarrhalis*.

Οξεία βρογχίτιδα και οξείες εξάρσεις χρόνιας βρογχίτιδας που προκαλούνται από *S. pneumoniae*, *H. influenzae* (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών τα οποία παράγουν β-λακταμάση), *H. parainfluenzae*, *M.catarrhalis* (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών τα οποία παράγουν β-λακταμάση), *S.aureus* εφόσον η ευαισθησία τους επιβεβαιωθεί *in vitro*.

Φαρυγγίτιδα και αμυγδαλίτιδα που προκαλούνται από *S. pyogenes* (β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι ομάδος A).

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πενικιλίνη αποτελεί συνήθως το φάρμακο εκλογής για τη θεραπεία και την πρόληψη των στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης και της προφύλαξης από το ρευματικό πυρετό. Η κεφακλόρη είναι γενικά αποτελεσματική στην εκρίζωση των στρεπτόκοκκων από το στοματοφάρυγγα. Όμως, δεν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες ως προς την αποτελεσματικότητά του στην πρόληψη του ρευματικού πυρετού).

Πνευμονία σε ασθενείς της κοινότητας που προκαλείται από *S.pneumoniae* (ελαφράς βαρύτητας περιπτώσεις), *H. influenzae* (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών τα οποία παράγουν β-λακταμάση), και *M.catarrhalis* (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών τα οποία παράγουν β-λακταμάση).

Μη επιπελεγμένες λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων της πυελονεφρίτιδας και κυστίτιδας, (με ταυτόχρονη κάλυψη για τα αναερόβια) που προκαλούνται από *E. coli*, *P.mirabilis*, *Klebsiella spp*.

Λοιμώξεις του δέρματος και μαλακών μορίων, που προκαλούνται από *Staphylococcus aureus* (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που παράγουν β-λακταμάση) και *S.pyogenes* (ομάδα A των β-αιμολυτικών στρεπτόκοκκων). Οι σταφυλόκοκκοι οι ανθεκτικοί στην πενικιλίνη είναι ανθεκτικοί και στην κεφακλόρη.

Παραρρινοκολπίτιδα που προκαλείται από ευαίσθητα στελέχη των μικροοργανισμών *H. influenzae* (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που παράγουν β-λακταμάση), *S.pyogenes* (β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας A), *S.pneumoniae*, *M.catarrhalis* και *S.aureus* (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που παράγουν β-λακταμάση). Οι σταφυλόκοκκοι οι ανθεκτικοί στην πενικιλίνη είναι ανθεκτικοί και στην κεφακλόρη. Στη χρόνια μορφή απαιτείται συνήθως προσθήκη και ενός άλλου αντιμικροβιακού παράγοντα, δραστικού στους αναερόβιους οργανισμούς.

Για να καθοριστεί ο παθογόνος μικροοργανισμός που προκαλεί την λοίμωξη καθώς και η

ευαισθησία του στην κεφακλόρη, πρέπει να γίνουν κατάλληλες βακτηριολογίας μελέτες. Η θεραπευτική αγωγή μπορεί να αρχίσει εν αναμονή των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων μελετών. Ανάλογα με τα ευρήματα προσαρμόζεται και η αντιμικροβιακή αγωγή.

2.3 Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του προϊόντος. Η χορήγησή του αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στην κεφακλόρη και άλλες κεφαλοσπορίνες, καθώς και με ιστορικά αναφυλακτικής αντίδρασης στις πενικιλίνες.

2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

2.4.1 Γενικές:

Πριν από την έναρξη της θεραπείας με Cefaclor, πρέπει να ληφθεί προσεκτικά ιστορικό προκειμένου να καθοριστεί εάν ο ασθενής είχε εμφανίσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας στις κεφαλοσπορίνες, τις πενικιλίνες ή σε άλλα φάρμακα κατά το παρελθόν. Το Cefaclor πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς ευαίσθητους στην πενικιλίνη.

Σε περίπτωση εκδήλωσης αλλεργικής αντίδρασης από την χορήγηση Cefaclor, η λήψη του φαρμάκου πρέπει να διακοπεί και να ενημερωθεί ο θεράπων ιατρός.

Σε σοβαρές περιπτώσεις οξείας υπερευαισθησίας μπορεί να απαιτηθεί λήψη μέτρων επείγουσας αντιμετώπισης. Τα αντιβιοτικά, συμπεριλαμβανομένης και της κεφακλόρης πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε κάθε ασθενή ο οποίος έχει εμφανίσει κάποια μορφή αλλεργίας, ιδίως σε φάρμακα.

Ψευδομεμβρανώδης κολίτις έχει αναφερθεί μετά από χορήγηση όλων σχεδόν των αντιβιοτικών ευρέως φάσματος (συμπεριλαμβανομένων των μακρολιδών, των ημισυνθετικών πενικιλινών και των κεφαλοσπορινών). Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι εκδηλώνουν διάρροια με τη χρήση αντιβιοτικών απαιτείται ενημέρωση του θεράποντος ιατρού. Συνήθως, αρκεί και μόνο η απλή διακοπή της χορήγησης του φαρμάκου για να υποχωρήσουν οι ήπιες περιπτώσεις ψευδομεμβρανώδους κολίτιδος. Σε περιστατικά μέτριας βαρύτητας ή σε σοβαρές περιπτώσεις, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Δεν έχουν καθορισθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε βρέφη μικρότερα του ενός (1) μηνός.

Το Cefaclor πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ιδιαίτερα σοβαρή βλάβη της νεφρικής λειτουργίας. Συνήθως δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. Απαιτείται, όμως, συχνός κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Η μακροχρόνια χορήγηση αντιβιοτικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ανθεκτικών μικροοργανισμών (επιλοίμωξη). Σημαντική είναι η προσεκτική παρακολούθηση του ασθενούς. Εάν κατά τη διάρκεια της αγωγής εμφανισθεί επιλοίμωξη, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

2.4.2 Ηλικιωμένοι:

Το Cefaclor μπορεί να χορηγηθεί και σε ηλικιωμένους ασθενείς (βλ. και Δοσολογία).

2.4.3 Κύηση:

Το Cefaclor πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνον όταν αυτό είναι

απολύτως απαραίτητο.

2.4.4 Γαλουχία:

Δεν είναι γνωστή η επίδραση του φαρμάκου επί των βρεφών τα οποία θηλάζουν. Απαιτείται προσοχή όταν το Cefaclor χορηγείται σε μητέρα η οποία θηλάζει.

2.4.5 Παιδιά:

Το Cefaclor ενδείκνυται για χορήγηση σε παιδιά (βλ. Παρ. 2.2 Ενδείξεις και Παρ. 2.6 Δοσολογία και Χορήγηση).

Δεν έχουν καθορισθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε βρέφη μικρότερα του 1 μηνός.

2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:

Το Cefaclor είναι ασφαλές και δεν αναμένεται να προκαλέσει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης των ασθενών.

2.4.7 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα:

Η μορφή των κοκκίων για πόσιμο εναιώρημα, περιέχει ζάχαρη.

2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες

Πρέπει να αναφέρετε στον ιατρό σας κάθε άλλο φάρμακο που τυχόν λαμβάνετε. Σπάνιες περιπτώσεις αυξημένης αντιπηκτικής δράσης έχουν παρατηρηθεί με την ταυτόχρονη χορήγηση Cefaclor με αντιπηκτικές ουσίες χορηγούμενες από του στόματος (βαρφαρίνη).

Η απέκκριση του Cefaclor από τους νεφρούς αναστέλλεται από την προβενεσίδη όπως συμβαίνει και με άλλα αντιβιοτικά.

Όταν το Cefaclor χορηγείται μαζί με τετρακυκλίνες ή χλωραμφενικόλη, έχει ανταγωνιστικό αποτέλεσμα.

2.6 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Το Cefaclor χορηγείται από του στόματος με ή χωρίς φαγητό. Για την μορφή του πόσιμου εναιωρήματος: Συμπληρώστε σταδιακά με νερό, μέχρι τη χαραγή με το τόξο.

Ανακινήστε καλά και συμπληρώστε ξανά με νερό μέχρι τη χαραγή. Ανακινήστε πάλι καθώς και πριν από κάθε χρήση.

Ενήλικες: Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 250 mg κάθε 8 ώρες, διπλασιαζόμενη σε σοβαρές λοιμώξεις.

Δόσεις μέχρι 4 gr/ημερησίως έχουν χορηγηθεί με ασφάλεια σε ενήλικες ασθενείς για 28 ημέρες, ωστόσο η συνολική ημερήσια δοσολογία να μην υπερβαίνει το όριο αυτό.

Παιδιά ηλικίας άνω του 1 μηνός: Η συνήθης δοσολογία στα παιδιά είναι 20-40 mg/Kg ημερησίως διαιρεμένη σε τρεις ίσες δόσεις. Η συνιστώμενη δοσολογία για περιπτώσεις βρογχίτιδας και πνευμονίας είναι 20 mg/Kg/ημερησίως σε τρεις διαιρεμένες δόσεις. Η συνήθης δοσολογία για σοβαρές λοιμώξεις (όπως πνευμονία), μέση ωτίτιδα ή λοιμώξεις που προκαλούνται από λιγότερο ευαίσθητους μικροοργανισμούς, είναι 40 mg/Kg ημερησίως σε τρεις διαιρεμένες δόσεις. Μέγιστη συνιστώμενη δόση στα παιδιά είναι 1 gr ημερησίως.

Δίνονται τα ακόλουθα παραδείγματα υπολογισμού δοσολογίας:

1. Δοσολογία εναιωρήματος Cefaclor (για δόση 20 mg/kg ημερησίως)

ΜΟΡΦΗ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ CEFACLOR			
Βάρος σώματος παιδιού	125mg/5ml	250mg/5ml	375mg/5ml*
9 kg	½ κουταλάκι/8ωρο	-	-
18 kg	1 κουταλάκι/8ωρο	½ κουταλάκι/8ωρο	½ κουταλάκι/12ωρο*

2. Δοσολογία εναιωρήματος Cefaclor (για δόση 40 mg/kg ημερησίως)

ΜΟΡΦΗ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ CEFACLOR			
Βάρος σώματος παιδιού	125mg/5ml	250mg/5ml	375mg/5ml*
9 kg	1 κουταλάκι/8ωρο	½ κουταλάκι/8ωρο	½ κουταλάκι/12ωρο*
18 kg	-	1 κουταλάκι/8ωρο	1 κουταλάκι/12ωρο*

Σημείωση: 1 κουταλάκι αντιστοιχεί σε 5ml

*Στη θεραπεία της μέσης ωτίτιδας και φαρυγγίτιδας, η συνολική ημερήσια δόση, μπορεί να διαιρεθεί και να χορηγηθεί ανά 12ωρο.

Το Cefaclor μπορεί να χορηγηθεί και σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια στους οποίους η συνιστώμενη δοσολογία συνήθως παραμένει αμετάβλητη (βλ. επίσης Παρ. 2.4.1, Γενικές Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις).

Στην θεραπεία λοιμώξεων από β-αιμολυτικούς στρεπτόκοκκους η αγωγή με Cefaclor πρέπει να χορηγείται επί 10 ημέρες τουλάχιστον.

2.7 Υπερδοσολογία και αντιμετώπιση

Στα τοξικά συμπτώματα τα οποία συνοδεύουν την υπερδοσολογία, μπορεί να συμπεριλαμβάνονται: ναυτία, έμετοι, επιγαστρική δυσφορία και διάρροια. Η σοβαρότητα της επιγαστρικής δυσφορίας και της διάρροιας είναι δόσοεξαρτώμενη. Όταν άλλα συμπτώματα είναι παρόντα, αυτά μπορεί να είναι δευτερογενή και να οφείλονται σε υποκείμενη νόσο, αλλεργική αντίδραση ή σε άλλη δηλητηρίαση.

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας να απευθυνθείτε στον ιατρό σας ή στα πλησιέστερο νοσοκομείο. (Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθήνας: 2107793777).

2.8 Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με Cefaclor:

Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας:

Δερματικά εξανθήματα, κνησμός, κνίδωση και θετική δοκιμασία άμεσης Coombs. Σπάνια πυρετός, αναφυλαξία (περισσότερο συχνή σε ασθενείς με ιστορικό αλλεργίας στην πενικιλίνη), πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Stevens-Johnson.

Συμπτώματα εκ του γαστρεντερικού συστήματος:

Διάρροια, ναυτία, έμετοι και επιγαστρικός φόρτος. Σπάνια ψευδομεμβρανώδης κολίτις μπορεί να εμφανισθεί κατά την διάρκεια ή μετά τη θεραπεία με αντιβιοτικά. Όπως και με την χορήγηση των πενικιλινών και άλλων κεφαλοσπορινών, σπάνια έχουν αναφερθεί παροδική ηπατίτιδα και χολοστατικός ίκτερος.

Επιλοιομόξεις από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς μπορεί να εμφανισθούν.

Σπάνια έχουν αναφερθεί ηωσινοφιλία, θρομβοκυττοπενία, αναστρέψιμη διάμεσος νεφρίτις, κνησμός γεννητικών οργάνων, κολπίτις.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε ασθενείς υπό αγωγή με Cefaclor, χωρίς η αιτιολογική συσχέτιση να είναι σαφής:

Κεντρικό νευρικό σύστημα:

Σπάνια έχουν αναφερθεί ανησυχία, νευρικότητα, αϋπνία, σύγχυση, υπέρτονία, ζάλη, κεφαλαλγία, παραισθήσεις και υπνηλία.

Ήπαρ: Παροδικές αυξήσεις στις τιμές των SGOT, SGPT και της αλκαλικής φωσφατάσης. Σπάνια ηπατική δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της χολόστασης.

Αίμα και λεμφικό σύστημα: Παροδική λεμφοκυττάρωση, λευκοπενία και σπάνια έχουν αναφερθεί αιμολυτική αναιμία, ακοκκιοκυτταραιμία και αναστρέψιμη ουδετεροπενία.

Σπάνια επίσης, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις αυξημένου χρόνου προθρομβίνης με ή χωρίς αιμορραγία σε ασθενείς που ελάμβαναν συγχρόνως Cefaclor και βαρφαρίνη.

Υποθρομβιναιμία μπορεί να παρατηρηθεί λόγω μειωμένης παραγωγής βιταμίνης K εκ διαταραχής της εντερικής χλωρίδας.

Νεφροί: Παροδική αύξηση του BUN ή της κρεατινίνης και παθολογικά ευρήματα στη γενική ούρων.

2.9 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος

Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στη συσκευασία.

2.10 Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής σε περίπτωση που παραλείψει να πάρει κάποια δόση

Σε περίπτωση που παραλείψατε μία δόση, να πάρετε τη δόση αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Εάν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, μην πάρετε τη δόση που παραλείψατε και συνεχίστε όπως πριν.

2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την φύλαξη του προϊόντος

Cefacloril κάψουλες: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C και σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Cefacloril κοκκία για πόσιμο εναιώρημα: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C και σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Μετά την ανασύσταση πρέπει να φυλάσσεται 14 ημέρες σε θερμοκρασία (2°-8°C).

2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών: 6/2003

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευτεί το γιατρό σας.
- Εάν κατά την διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα, μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε, θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- Για την ασφάλεια και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- Μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να τα αλλοιώσουν και να τα καταστήσουν επιβλαβή για την υγεία σας.
- Μην κρατάτε φάρμακα που δεν χρειάζεστε πλέον ή που έχουν ήδη λήξει.
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.