

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Risosfon 75 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Risedronate sodium

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμη και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το Risosfon και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Risosfon
3. Πώς να πάρετε το Risosfon
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Risosfon
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Risosfon και ποια είναι η χρήση του

Τι είναι το Risosfon

Το Risosfon ανήκει σε μια κατηγορία μη ορμονικών φαρμάκων που ονομάζονται διφωσφονικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση οστικών παθήσεων. Δρα άμεσα στα οστά σας για να τα κάνει πιο δυνατά και συνεπώς λιγότερο πιθανό να σπάσουν.

Το οστό είναι ένας ζωντανός ιστός. Το παλαιό οστό απομακρύνεται συνεχώς από το σκελετό σας και αντικαθίσταται με νέο οστό.

Η μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση είναι μια πάθηση που εμφανίζεται στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, όπου τα οστά γίνονται ασθενέστερα και πιο εύθραυστα και είναι περισσότερο πιθανό να σπάσουν μετά από μια πτώση ή ένα διάστρεμμα.

Η σπονδυλική στήλη, το ισχίο και ο καρπός είναι τα οστά που είναι πιο πιθανό να σπάσουν, αν και αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε οστό στο σώμα σας. Κατάγματα που σχετίζονται με την οστεοπόρωση μπορούν επίσης να προκαλέσουν οσφυαλγία, απώλεια ύψους και κυρτή πλάτη. Πολλοί ασθενείς με οστεοπόρωση δεν έχουν καθόλου συμπτώματα. Μπορεί να μην έχετε καν καταλάβει ότι πάσχετε από οστεοπόρωση.

Ποια είναι η χρήση του Risosfon

Η αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Risosfon

Μην πάρετε το Risosfon

- Σε περίπτωση αλλεργίας στη νατριούχο ρισεδρονάτη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6)
- Εάν ο γιατρός σας, σας έχει πει ότι έχετε υπασβεστιαμία (χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα)
- Εάν είναι πιθανό να είστε έγκυος, είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος
- Εάν θηλάζετε

- Εάν έχετε σοβαρά προβλήματα με τους νεφρούς.
- Εάν είστε κάτω των 18 ετών

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Risosfon :

- Εάν δεν είστε σε θέση να κρατήσετε ίσια την πλάτη σας (σε καθιστή ή όρθια θέση) για τουλάχιστον 30 λεπτά.
- Εάν έχετε παθολογικό μεταβολισμό οστών και ανόργανων αλάτων (για παράδειγμα έλλειψη βιταμίνης D ή παθολογικά επίπεδα παραθυρεοειδούς ορμόνης, καταστάσεις που οδηγούν αμφοτέρως σε χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα).
- Εάν είχατε στο παρελθόν προβλήματα με τον οισοφάγο σας (το σωλήνα που ενώνει το στόμα με το στομάχι σας). Για παράδειγμα, εάν είχατε πόνο ή δυσκολία κατά την κατάποση της τροφής ή εάν σας είχαν διαγνώσει οισοφάγο Barrett (μια κατάσταση που σχετίζεται με μετάπλαση των κυττάρων στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου).
- Εάν είχατε ή έχετε πόνο, οίδημα ή αιμωδία της γνάθου ή «αίσθημα βαριάς γνάθου» ή χαλάρωση κάποιου δοντιού.
- Εάν είστε υπό οδοντιατρική θεραπεία ή πρόκειται να υποβληθείτε σε οδοντιατρικό χειρουργείο, ενημερώστε τον οδοντίατρό σας ότι λαμβάνετε Risosfon.

Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει τι να κάνετε όταν παίρνετε Risosfon εάν έχετε κάτι από τα παραπάνω.

Παιδιά και έφηβοι

Η νατριούχος ρισεδρονάτη δε συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών λόγω ανεπαρκών στοιχείων αναφορικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά.

Άλλα φάρμακα και Risosfon

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Τα φάρμακα που περιέχουν ένα από τα ακόλουθα μειώνουν τη δράση του Risosfon, εάν ληφθούν ταυτόχρονα:

- Ασβέστιο
- Μαγνήσιο
- Αργίλιο (για παράδειγμα ορισμένα μίγματα για τη δυσπεψία)
- Σίδηρος.

Πάρτε αυτά τα φάρμακα τουλάχιστον 30 λεπτά μετά από τη λήψη του δισκίου Risosfon.

Το Risosfon με τροφές και ποτά

Μην καταναλώνετε τροφές ή ποτά (εκτός από σκέτο νερό) πριν περάσουν 30 λεπτά από τη λήψη του δισκίου Risosfon.

Είναι πολύ σημαντικό να ΜΗΝ παίρνετε το φάρμακο αυτό μαζί με τροφές ή ποτά (εκτός από σκέτο νερό), ώστε να μπορέσει να δράσει κατάλληλα. Συγκεκριμένα μην πάρετε αυτό το φάρμακο κατά την ίδια χρονική στιγμή με γαλακτοκομικά προϊόντα (όπως το γάλα), καθώς αυτά περιέχουν ασβέστιο (βλέπε παράγραφο 2 “ Άλλα φάρμακα και Risosfon ”).

Κύηση και θηλασμός

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

ΜΗΝ πάρετε το Risosfon εάν είναι πιθανό να είστε έγκυος, είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος (βλέπε παράγραφο 2, “Μην πάρετε το Risosfon ”). Ο δυνητικός κίνδυνος που σχετίζεται με τη χρήση της νατριούχου ρισεδρονάτης σε έγκυες γυναίκες δεν είναι γνωστός.

ΜΗΝ πάρετε το Risosfon εάν θηλάζετε (βλέπε παράγραφο 2, “Μην πάρετε το Risosfon ”).

Το Risosfon πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη θεραπεία μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Το Risosfon δεν είναι γνωστό ότι επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

Το Risosfon περιέχει μαλτόζη

Το Risosfon περιέχει μαλτόζη (ένα παράγωγο της γλυκόζης). Εάν ο γιατρός σας σας έχει πληροφορήσει ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

3. Πώς να πάρετε το Risosfon

Πάντοτε να παίρνετε το Risosfon αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν λαμβάνεται από το στόμα.

Η συνιστώμενη δόση είναι:

Τα δισκία Risosfon πρέπει να λαμβάνονται κατά τις ΙΔΙΕΣ δύο συνεχόμενες ημέρες κάθε μήνα, π.χ. κατά την 1^η και 2^η ημέρα του μήνα ή κατά τη 15^η και 16^η ημέρα. Επιλέξτε ΔΥΟ ημερομηνίες στη σειρά που να ταιριάζουν καλύτερα στο πρόγραμμά σας για να παίρνετε το Risosfon. Πάρτε ΕΝΑ δισκίο Risosfon το πρωί της πρώτης ημέρας που επιλέξατε. Πάρτε το ΔΕΥΤΕΡΟ δισκίο το πρωί της επόμενης ημέρας. Επαναλάβετε κάθε μήνα κρατώντας τις ίδιες δύο συνεχόμενες ημέρες. Για να βοηθηθείτε να θυμάστε πότε πρέπει να πάρετε τα επόμενα δισκία, μπορείτε να το σημειώσετε από πριν στο ημερολόγιό σας με στυλό ή αυτοκόλλητο.

Πότε να πάρετε το δισκίο Risosfon

Πάρτε το δισκίο Risosfon τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την πρώτη πρόσληψη τροφής, ποτού (εκτός από σκέτο νερό) ή άλλου φαρμάκου για την ημέρα.

Πώς να πάρετε το δισκίο Risosfon

- Πάρτε το δισκίο με ίσια την πλάτη σας (μπορείτε να είστε σε καθιστή ή όρθια θέση) για να αποφύγετε αίσθημα καύσου.
- Καταπιείτε το με τουλάχιστον ένα ποτήρι (120 ml) σκέτο νερό. Μην λάβεται το δισκίο με μεταλλικό νερό ή ποτά πέρα από το απλό νερό.
- Καταπιείτε το ολόκληρο. Να μην το απομυζήσετε ή το μασήσετε.
- Μην ξαπλώσετε για 30 λεπτά μετά από τη λήψη του δισκίου.

Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει εάν χρειάζεστε ασβέστιο και συμπληρώματα βιταμινών, σε περίπτωση που δεν προσλαμβάνετε αρκετή ποσότητα από τη διατροφή σας.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Risosfon από την κανονική

Εάν εσείς ή κάποιος άλλος πάρετε κατά λάθος περισσότερα δισκία Risosfon από εκείνα που σας έχουν συνταγογραφηθεί, πιείτε ένα γεμάτο ποτήρι γάλα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Risosfon

Ξεχάσατε	Πότε	Τι να κάνετε
1 ^ο και 2 ^ο δισκίο	Η επόμενη μηνιαία δόση απέχει περισσότερο από 7 ημέρες	Πάρτε το 1ο δισκίο το επόμενο πρωί και το 2ο δισκίο το πρωί της επόμενης ημέρας

	Η επόμενη μηνιαία δόση απέχει έως 7 ημέρες	Μην πάρετε τα δισκία που έχετε ξεχάσει
2 ^ο δισκίο μόνο	Η επόμενη μηνιαία δόση απέχει περισσότερο από 7 ημέρες	Πάρτε το 2ο δισκίο το επόμενο πρωί
	Η επόμενη μηνιαία δόση απέχει έως 7 ημέρες	Μην πάρετε το δισκίο που έχετε ξεχάσει
Τον επόμενο μήνα πάρτε ξανά τα δισκία σας, όπως συνήθως.		

Σε κάθε περίπτωση:

- Εάν χάσετε τη δόση του Risosfon το πρωί, να ΜΗΝ την πάρετε αργότερα μέσα στην ημέρα.
- ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ τρία δισκία μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Risosfon

Με τη διακοπή της θεραπείας ενδέχεται να ξεκινήσετε να χάνετε οστική μάζα. Παρακαλείσθε να μιλήσετε με το γιατρό σας πριν εξετάσετε το ενδεχόμενο να διακόψετε τη θεραπεία.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Σταματήστε να παίρνετε το Risosfon και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας εάν έχετε κάτι από τα ακόλουθα:

- Συμπτώματα **σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης** όπως:
 - Οίδημα του προσώπου, της γλώσσας και/ή του λαιμού
 - Δυσκολία στην κατάποση
 - Δυσκολία στην αναπνοή
 - Κνίδωση, δερματικό εξάνθημα.
- **Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις** όπως:
 - Φουσκάλες στο δέρμα, στο στόμα, στα μάτια και σε άλλες υγρές επιφάνειες του σώματος (γεννητικά όργανα) (σύνδρομο Steven- Johnson).
 - Ψηλαφούμενες κόκκινες κηλίδες στο δέρμα (λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα).
 - Ερυθρό εξάνθημα σε πολλά σημεία του σώματος και/ή απώλεια της εξωτερικής στιβάδας του δέρματος (τοξική επιδερμική νεκρόλυση).

Μιλήστε άμεσα με το γιατρό σας εάν έχετε τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:

- Φλεγμονή στα μάτια, συνήθως με πόνο, ερυθρότητα και φωτοευαισθησία.
- Νέκρωση των οστών της γνάθου (οστεονέκρωση) σχετιζόμενη με καθυστερημένη επούλωση και μόλυνση, συχνά μετά από εξαγωγή δοντιών (βλέπε παράγραφο 2, “ Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις”).
- Συμπτώματα από τον οισοφάγο όπως πόνο κατά την κατάποση, δυσκολία στην κατάποση, πόνο στο στήθος ή νέο/επιδεινωθέν αίσθημα καύσου.

Ωστόσο, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές μελέτες ήταν συνήθως ήπιες και δεν προκάλεσαν τη διακοπή της λήψης των δισκίων από τον ασθενή.

Πολύ σπάνιες

- Απευθυνθείτε στον γιατρό σας εάν έχετε πόνο στο αυτί, εκκρίσεις από το αυτί ή/και λοίμωξη στο αυτί. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να αποτελούν ενδείξεις βλάβης στο οστό του αυτιού

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στους 10 ανθρώπους)

- Δυσπεψία, αδιαθεσία, πόνος στο στομάχι, στομαχικές κράμπες ή ενοχλήσεις, δυσκοιλιότητα, αίσθημα πλήρωσης του στομάχου, φούσκωμα, διάρροια.
- Πόνος στα οστά, στους μύες ή στις αρθρώσεις.
- Πονοκέφαλος.

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στους 100 ανθρώπους)

- Φλεγμονή ή έλκος του οισοφάγου (ο σωλήνας που ενώνει το στόμα με το στομάχι σας), η οποία προκαλεί δυσκολία και πόνο κατά την κατάποση (βλέπε επίσης παράγραφο 2 “Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις”), φλεγμονή του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου (το τμήμα του εντέρου στο οποίο αδειάζει το περιεχόμενο του στομάχου).
- Φλεγμονή του χρωματιστού τμήματος του ματιού (ίριδα) (κόκκινα επώδυνα μάτια με μια πιθανή μεταβολή της όρασης).
- Πυρετός και/ή συμπτώματα ομοιάζοντα της γριπώδους συνδρομής.

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στους 1.000 ανθρώπους)

- Φλεγμονή της γλώσσας (πολύ κόκκινη και πρησμένη, ενδεχομένως επώδυνη), στένωση του οισοφάγου (το σωλήνα που ενώνει το στόμα με το στομάχι σας).
- Έχουν αναφερθεί παθολογικές τιμές στις ηπατικές εξετάσεις. Αυτές μπορούν να διαγνωσθούν μόνο μέσω μιας εξέτασης αίματος.
- Αλλεργική φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων (λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα).

Από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου, έχουν αναφερθεί τα ακόλουθα (άγνωστη συχνότητα):

- Απώλεια μαλλιών.
- Ηπατικές διαταραχές, ορισμένες περιπτώσεις ήταν σοβαρές.
- Φλεγμονή των μικρών αιμοφόρων αγγείων

Σπάνια στην αρχή της θεραπείας τα επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου στο αίμα μπορεί να πέσουν. Οι αλλαγές αυτές είναι συνήθως μικρές και δεν προκαλούν συμπτώματα.

Μη σύνηθες κάταγμα του μηριαίου οστού, ιδιαίτερα σε ασθενείς σε μακροχρόνια θεραπεία για οστεοπόρωση μπορεί να εμφανισθεί σπάνια. Επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν νιώσετε πόνο, αδυναμία ή δυσφορία στο μηρό σας, στο ισχίο σας ή στη βουβωνική σας χώρα, καθώς αυτό μπορεί να αποτελεί πρόωμη ένδειξη ενός πιθανού κατάγματος του μηριαίου οστού.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς φυλάσσεται το Risosfon

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στην κυψέλη μετά την ένδειξη EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το φαρμακευτικό αυτό προϊόν..

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Risosfon

Η δραστική ουσία είναι η νατριούχος ρισεδρονάτη. Κάθε δισκίο περιέχει 75 mg νατριούχου ρισεδρονάτης, τα οποία ισοδυναμούν με 69,6 mg ρισεδρονικού οξέος.

Τα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας δισκίου: Maltose (Advantose 100), cellulose microcrystalline (ph 102 Avicel), croscarmellose sodium και magnesium stearate.

Επικάλυψη με λεπτό υμένιο: Ροζ Opadry II αποτελούμενο από: polyvinyl alcohol, titanium dioxide (E171), macrogol 3350, talc, red iron oxide (E172), quinoline yellow aluminum lake (E104).

Εμφάνιση του Risosfon και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Risosfon 75 mg είναι ροζ, οβάλ δισκία, αμφίκυρτα 12.4 x 4.0 mm. Τα δισκία παρέχονται σε συσκευασίες κυψέλης των 2, 4, 6 ή 8 δισκίων.

Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 106, Τ.Κ. 153 44

Γέρακας Αττικής

Τηλ.:210.60.48.560

Παραγωγός

ONE PHARMA A.E.

60° χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,

Σχηματάρι Βοιωτίας

Ελλάδα

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Γαλλία: RISEDRONATE PHARMANEL 75mg, comprimé pelliculé

Ελλάδα: Risosfon 75mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Πορτογαλία: Risedronato de sódio/Pharmanel 75mg comprimidos revestidos por película

Ισπανία: Risedronato Ababor 75mg comprimidos recubiertos con película EFG

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις