

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

Pancreatin/BGP 20.000 γαστροανθεκτικά καψάκια, σκληρά Κόνις παγκρέατος

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το Pancreatin/BGP και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Pancreatin/BGP
3. Πώς να πάρετε το Pancreatin/BGP
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Pancreatin/BGP
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Pancreatin/BGP και ποια είναι η χρήση του

Τι είναι το Pancreatin/BGP

- Το Pancreatin/BGP περιέχει ένα μίγμα ενζύμων που ονομάζεται «κόνις παγκρέατος».
- Η κόνις παγκρέατος ονομάζεται επίσης παγκρεατίνη. Σας βοηθά στην πέψη της τροφής. Τα ένζυμα λαμβάνονται από χοίρειο πάγκρεας.
- Τα καψάκια Pancreatin/BGP περιέχουν μικροσφαιρίδια που απελευθερώνουν αργά την κόνι παγκρέατος στο έντερό σας (γαστροανθεκτικά μικροσφαιρίδια, που ονομάζονται minimicrospheres).

Ποια είναι η χρήση του Pancreatin/BGP

Το Pancreatin/BGP χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της «εξωκρινούς παγκρεατικής ανεπάρκειας». Αυτό συμβαίνει όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετά ένζυμα για την πέψη της τροφής. Συναντάται για παράδειγμα συχνά σε ανθρώπους:

- που έχουν κυστική ίνωση, μια σπάνια γενετική διαταραχή
- που έχουν χρόνια φλεγμονή του παγκρέατος (χρόνια παγκρεατίτιδα)
- στους οποίους έχει αφαιρεθεί όλο ή μέρος του παγκρέατος (ολική ή μερική παγκρεατεκτομή)
- που έχουν καρκίνο παγκρέατος

Το Pancreatin/BGP 20.000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Η δοσολογία σε κάθε ηλικιακή ομάδα περιγράφεται στην παράγραφο 3 αυτού του φυλλαδίου, «Πώς να πάρετε το Pancreatin/BGP».

Η θεραπεία με το Pancreatin/BGP βελτιώνει τα συμπτώματα της εξωκρινούς παγκρεατικής ανεπάρκειας συμπεριλαμβανομένης της σύστασης των κοπράνων (π.χ. λιπώδη κόπρανα), του κοιλιακού άλγους, του μετεωρισμού, και της συχνότητας των κενώσεων (διάρροια ή δυσκοιλιότητα), ανεξάρτητα από την υποκείμενη νόσο.

Πώς δρα το Pancreatin/BGP

Τα ένζυμα του Pancreatin/BGP δρουν διασπώντας την τροφή καθώς περνάει μέσα από το έντερο. Πρέπει να λαμβάνετε το Pancreatin/BGP κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από ένα κανονικό ή ένα πρόχειρο γεύμα. Αυτό θα επιτρέψει στα ένζυμα να αναμιχθούν πλήρως με την τροφή.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Pancreatin/BGP

Μην πάρετε το Pancreatin/BGP

- σε περίπτωση αλλεργίας στην κόνι παγκρέατος ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά του Pancreatin/BGP (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Pancreatin/BGP.

Ασθενείς με κυστική ίνωση

Μια σπάνια πάθηση του εντέρου που ονομάζεται «ινώδης εντεροπάθεια», κατά την οποία στενεύει το έντερο, έχει αναφερθεί σε ασθενείς με κυστική ίνωση που λάμβαναν υψηλές δόσεις προϊόντων κόνεως παγκρέατος. Εάν πάσχετε από κυστική ίνωση και λαμβάνετε περισσότερες από 10.000 μονάδες λιπάσης ανά κιλό σωματικού βάρους ανά ημέρα και εμφανίσετε ασυνήθιστα κοιλιακά συμπτώματα ή μεταβολές κοιλιακών συμπτωμάτων **ενημερώστε το γιατρό σας**.

Η δοσολογία των μονάδων λιπάσης περιγράφεται στην παράγραφο 3 αυτού του φυλλαδίου, «Πώς να πάρετε το Pancreatin/BGP».

Σοβαρή αλλεργική αντίδραση

Εάν συμβεί μια αλλεργική αντίδραση, σταματήστε τη θεραπεία σας και ενημερώστε το γιατρό σας. Μια αλλεργική αντίδραση μπορεί να περιλαμβάνει κνησμό, κνίδωση ή εξάνθημα. Σπάνια, μια πιο σοβαρή αλλεργική αντίδραση ενδέχεται να περιλαμβάνει αίσθημα θερμότητας, ζάλη και λιποθυμία, δυσκολία στην αναπνοή.

Αυτά είναι συμπτώματα μιας σοβαρής, ενδεχομένως απειλητικής για τη ζωή κατάστασης που ονομάζεται «αναφυλακτικό σοκ». Εάν συμβεί αυτό, ζητήστε αμέσως επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν έχετε αλλεργία στις πρωτεΐνες χοίρειας προέλευσης πριν να πάρετε το Pancreatin/BGP.

Ερεθισμός του στόματος

Στοματικός πόνος, ερεθισμός (στοματίτιδα), αιμορραγία και δημιουργία έλκους μέσα στο στόμα ενδέχεται να εμφανιστούν σε περίπτωση που τα καψάκια μασιούνται και/ή παραμένουν πολύ ώρα μέσα στο στόμα. Το ξέπλυμα του στόματος και η λήψη ενός ποτηριού νερού μπορεί να βοηθήσουν εάν υπάρχουν πρώιμα σημεία ερεθισμού στόματος.

Το Pancreatin/BGP μπορεί να πασπαλιστεί μόνο σε ορισμένες τροφές (βλ. παράγραφο 3 αυτού του φυλλαδίου, «Πώς να πάρετε το Pancreatin/BGP»).

Αυτό το φάρμακο περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δοσολογική μονάδα, είναι δηλαδή ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου».

Άλλα φάρμακα και Pancreatin/BGP

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν μπορείτε να πάρετε το Pancreatin/BGP ενώ είστε έγκυος.

Το Pancreatin/BGP μπορεί να ληφθεί κατά το θηλασμό.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Pancreatin/BGP δεν επηρεάζει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε εργαλεία ή μηχανήματα.

3. Πώς να πάρετε το Pancreatin/BGP

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η δόση σας μετριέται σε «μονάδες λιπάσης». Η λιπάση είναι ένα από τα ένζυμα της κόνεως παγκρέατος. Οι διαφορετικές περιεκτικότητες του Pancreatin/BGP περιέχουν διαφορετικές ποσότητες λιπάσης.

Πάντοτε να ακολουθείτε τη συμβουλή του γιατρού σας σχετικά με το πόσο Pancreatin/BGP να πάρετε. Ο γιατρός σας θα προσαρμόσει τη δόση σας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Αυτή θα εξαρτηθεί από:

- τη βαρύτητα της ασθένειάς σας
- το σωματικό βάρος σας
- τη διατροφή σας
- πόσο λίπος υπάρχει στα κόπρανά σας.

Αν εξακολουθείτε να έχετε λιπώδη κόπρανα ή άλλα προβλήματα στομάχου ή εντέρου (συμπτώματα από το γαστρεντερικό), ενημερώστε το γιατρό σας καθώς η δόση σας μπορεί να χρειάζεται να προσαρμοστεί.

Πόσο Pancreatin/BGP να πάρετε

Για ασθενείς με κυστική ίνωση

Παιδιά:

Η περιεκτικότητα αυτού του φαρμάκου μπορεί να μην ενδείκνυται για έναρξη θεραπείας σε παιδιά, γεγονός που εξαρτάται από την ηλικία και το σωματικό βάρος του παιδιού.

Η απαιτούμενη δόση για ένα παιδί θα πρέπει να προσδιορίζεται από το γιατρό μέσω δοσολογικών μορφών που περιέχουν λιγότερες μονάδες λιπάσης (π.χ. 10.000 ή 5.000 μονάδες λιπάσης).

Αφού προσδιοριστεί η δόση ανά γεύμα, η εν λόγω περιεκτικότητα του φαρμάκου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα παιδιά.

- Η συνήθης εναρκτήρια δόση για παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών είναι 1000 μονάδες λιπάσης ανά κιλό σωματικού βάρους ανά γεύμα.
- Η συνήθης εναρκτήρια δόση για παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω είναι 500 μονάδες λιπάσης ανά κιλό σωματικού βάρους ανά γεύμα.

Έφηβοι και ενήλικες:

Σε εφήβους και ενήλικες, η ενζυμική δοσολογία βάσει του σωματικού βάρους θα πρέπει να ξεκινά με 500 μονάδες λιπάσης ανά κιλό σωματικού βάρους ανά γεύμα.

Για όλες τις ηλικιακές ομάδες:

Η δόση σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2.500 μονάδες λιπάσης ανά κιλό σωματικού βάρους ανά γεύμα ή τις 10.000 μονάδες λιπάσης ανά κιλό σωματικού βάρους ανά ημέρα ή τις 4.000 μονάδες λιπάσης ανά γραμμάριο προσλαμβανόμενου λίπους.

Για ασθενείς με άλλα προβλήματα του παγκρέατος

Έφηβοι και ενήλικες:

Η συνήθης δόση για ένα κανονικό γεύμα είναι μεταξύ 25.000 και 80.000 μονάδων λιπάσης.

Η συνήθης δόση για ένα πρόχειρο γεύμα είναι το μισό της δόσης ενός κανονικού γεύματος.

Πότε να πάρετε το Pancreatin/BGP

Πάντοτε να παίρνετε το Pancreatin/BGP κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από ένα κανονικό ή πρόχειρο γεύμα. Αυτό θα επιτρέψει στα ένζυμα να αναμιχθούν πλήρως με την τροφή και να την πέψουν καθώς περνάει μέσα από το έντερο.

Πώς να πάρετε το Pancreatin/BGP

- Το Pancreatin/BGP πρέπει να λαμβάνεται πάντα μαζί με ένα κανονικό ή ενδιάμεσο γεύμα.
- Τα καψάκια πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα και να λαμβάνονται μαζί με νερό ή χυμό
- Δεν πρέπει να σπάζετε ή να μασάτε τα καψάκια ή το περιεχόμενό τους, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό μέσα στο στόμα σας ή να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο το Pancreatin/BGP επιδρά στο σώμα σας.
- Εάν είναι δύσκολο να καταπιείτε τα καψάκια, ανοίξτε τα προσεκτικά και προσθέστε τα μικροσφαιρίδια σε μια μικρή ποσότητα μαλακής όξινης τροφής ή αναμίξτε τα με όξινα υγρά. Όξινες μαλακές τροφές μπορεί να είναι ο πουρές μήλου ή το γιαούρτι. Όξινα υγρά μπορούν να είναι χυμοί μήλου, πορτοκαλιού ή ανανά. Μην αναμιγνύετε τα μικροσφαιρίδια με νερό, γάλα συμπεριλαμβανομένου γάλακτος με διάφορες γεύσεις, μητρικό γάλα και έτοιμα βρεφικά γάλατα, ή με ζεστές τροφές. Καταπιείτε το μίγμα αμέσως, χωρίς να το συνθλίψετε ή να το μασήσετε και πιείτε λίγο νερό ή χυμό.
- Η ανάμιξη με μη-όξινη τροφή ή υγρά, η θραύση ή η μάσηση των σφαιριδίων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό μέσα στο στόμα σας ή να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο το Pancreatin/BGP επιδρά στο σώμα σας.
- Μην κρατάτε τα καψάκια Pancreatin/BGP ή το περιεχόμενό τους μέσα στο στόμα σας. Βεβαιωθείτε πως έχετε καταπιεί πλήρως το φάρμακο και το μίγμα της τροφής και πως δεν έχουν παραμείνει καθόλου μικροσφαιρίδια μέσα στο στόμα σας.
- Μην φυλάσσετε το μίγμα.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Pancreatin/BGP από την κανονική

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Pancreatin/BGP από την κανονική, πιείτε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό ή φαρμακοποιό.

Πολύ υψηλές δόσεις κόνεως παγκρέατος έχουν μερικές φορές προκαλέσει την εμφάνιση υπερβολικής ποσότητας ουρικού οξέος στα ούρα (υπερουρικοζουρία) και στο αίμα (υπερουριχαιμία).

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Pancreatin/BGP

Εάν ξεχάσετε μια δόση, πάρτε την επόμενη δόση σας τη συνηθισμένη ώρα, με το επόμενο γεύμα σας. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε μία δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Pancreatin/BGP

Μην σταματήσετε τη λήψη του Pancreatin/BGP χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθείτε το γιατρό σας. Πολλοί ασθενείς θα χρειαστεί να παίρνουν το Pancreatin/BGP για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Pancreatin/BGP μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες ενδέχεται να σημειωθούν με αυτό το φάρμακο.

Οι πιο σημαντικές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί με φάρμακα υποκατάστασης παγκρεατικών ενζύμων είναι το «αναφυλακτικό σοκ» και η ινώδης εντεροπάθεια.

Αυτές οι δύο ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν σημειωθεί σε πολύ μικρό αριθμό ατόμων, όμως η ακριβής συχνότητα εμφάνισής τους δεν είναι γνωστή.

Το αναφυλακτικό σοκ είναι μια σοβαρή, δυνητικά απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση η οποία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ζητήστε αμέσως επείγουσα ιατρική βοήθεια:

- κνησμός, κνίδωση ή εξάνθημα
- πρησμένο πρόσωπο, μάτια, χείλη, χέρια ή πόδια
- αίσθημα ελαφράς κεφαλής ή λιποθυμία
- δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση
- αίσθημα παλμών

- ζάλη, κατέρρευση ή απώλεια συνείδησης.

Οι επαναλαμβανόμενες υψηλές δόσεις φαρμάκων υποκατάστασης παγκρεατικών ενζύμων μπορούν επίσης να προκαλέσουν ουλοποίηση ή πάχυνση του τοιχώματος του εντέρου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη των εντέρων, μια κατάσταση που ονομάζεται ινώδης εντεροπάθεια. Εάν παρουσιάσετε έντονο στομαχικό άλγος, δυσκολία στην απόδευση (δυσκοιλιότητα), ναυτία ή έμετο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας.

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να προσβάλλουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα)

- πόνος στο στομάχι σας (κοιλιά).

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να προσβάλλουν έως 1 στα 10 άτομα)

- ναυτία
- έμετος
- δυσκοιλιότητα
- τυμπανισμός (κοιλιακή διάταση)
- διάρροια.

Αυτές μπορεί να οφείλονται στην πάθηση για την οποία παίρνετε το Pancreatin/BGP.

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να προσβάλλουν έως 1 στα 100 άτομα)

- εξάνθημα

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσετε το Pancreatin/BGP

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.

Μετά το άνοιγμα μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C και χρησιμοποιήστε εντός 6 μηνών. Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλεισμένο για να προστατεύεται από την υγρασία.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Pancreatin/BGP

Η δραστική ουσία του Pancreatin/BGP είναι η κόνις παγκρέατος.

- Κάθε καψάκιο Pancreatin/BGP 20.000 περιέχει 300 mg κόνεως παγκρέατος που αντιστοιχούν σε (μονάδες Ph. Eur.):
 - Λιπάση 20.000
 - Αμυλάση 16.000
 - Πρωτεάση 1.200

- Τα άλλα συστατικά είναι:

Περιεχόμενο καψακίου:

- Υπρομελλόζη φθαλική
- Πολυαιθυλενογλυκόλη 4000
- Τριαιθυλεστέρας κιτρικός
- Διμεθικόνη 1000
- Κητυλική αλκοόλη

Κέλυφος καψακίου:

- Ζελατίνη
- Σιδήρου οξείδιο ερυθρό, κίτρινο και μέλαν (E 172)
- Νάτριο λαουρυλοθειικό
- Τιτανίου διοξείδιο (E171)

Εμφάνιση του Pancreatin/BGP και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα καψάκια Pancreatin/BGP 20.000 είναι μεγέθους 0 επιμηκυσμένα. Είναι καφέ χρώματος και διαφανή. Περιέχουν καστανόχρωμα γαστροανθεκτικά μικροσφαιρίδια (minimicrospheres).

Τα καψάκια Pancreatin/BGP 20.000 διατίθενται σε φιάλες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με βιδωτό πώμα πολυπροπυλενίου (PP) που περιέχουν 50 καψάκια, 60 καψάκια, 100 καψάκια, 120 καψάκια, 200 καψάκια, 250 καψάκια.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Αγ. Δημητρίου 63

Άλιμος 174 56

Τηλ.: 210 9891777

Παρασκευαστής:

Abbott Laboratories GmbH

Justus-von-Liebig-Str. 33

31535 Neustadt

Γερμανία

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Αυστρία	KREON 20.000 Einheiten - Kapseln
Βέλγιο	Creon 20.000, 300 mg, maagsapresistente capsules, hard
Βουλγαρία	Kreon 20 000 gastro-resistant capsules, hard
Κροατία	KREON® 20 000 želučanootporne kapsule, tvrde
Κύπρος	Pancreatin/BGP 20.000
Δημοκρατία της Τσεχίας	KREON
Δανία	Creon 20.000
Εσθονία	Kreon 20 000 U
Φινλανδία	Creon 20 000 enterokapseli, kova
Γαλλία	CREON 20 000 U, gélule gastro-résistante
Ελλάδα	Pancreatin/BGP 20.000
Ουγγαρία	Kreon 20 000 egység gyomornedv-ellenálló kemény kapszula
Ισλανδία	Creon 20.000 sýrupolin hylki, hörð

Ιρλανδία	Creon 20000 Gastro-resistant Capsules
Ιταλία	CreonIPE 20 000
Λετονία	Kreon 20 000 V zarnās šķīstošās cietās kapsulas
Λιθουανία	Pancreas powder mylan 20 000 V skrandyje neirios
Λουξεμβούργο	Creon 20000, 300 mg, gélules gastro-résistantes
Μάλτα	Creon® 20000 Capsules
Ολλανδία	Creon 20.000, harde maagsap resistente capsules 20.000 eenheden
Νορβηγία	Creon 20000
Πολωνία	Kreon 20 000
Πορτογαλία	KREON 20000, Cápsula gastro-resistente
Ρουμανία	KREON 20000 capsule gastrozistente
Σλοβακία	Kreon 20 000, tvrdé gastrozistentné kapsuly
Σλοβενία	Kreon EPI 20 000 Ph.Eur.e. trde gastrozistentne kapsule
Ισπανία	Kreon 20.000 U cápsulas duras gastrorresistentes
Σουηδία	Creon 20000 enterokapslar, hårda
Ηνωμένο Βασίλειο	Creon® 20000 Capsules

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις