

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

**Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
GRANELOCK (500+5) mg/tab Δισκία**

Paracetamol
Metoclopramide hydrochloride

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή γι' αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

- 1 Τι είναι το Granelock και ποια είναι η χρήση του
- 2 Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Granelock
- 3 Πώς να πάρετε το Granelock
- 4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
- 5 Πώς να φυλάσσετε το Granelock
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Granelock και ποια είναι η χρήση του

Τι είναι το Granelock

Το Granelock περιέχει δύο διαφορετικές δραστικές ουσίες. Αυτές είναι:

- **Υδροχλωρική μετοκλοπραμίδη:** η οποία ανήκει στην κατηγορία των αντιεμετικών φαρμάκων. Επιδρά στους μυς του άνω πεπτικού συστήματος προκαλώντας κένωση του στομάχου. Επιπλέον δρα σε μια περιοχή του εγκεφάλου που αποτρέπει την τάση για εμετό (ναυτία) ή τον εμετό.
- **Παρακεταμόλη:** η οποία ανήκει στην κατηγορία των παυσίπονων (αναλγητικών) φαρμάκων. Δρα αναστέλλοντας την σύνθεση ουσιών που παράγονται φυσιολογικά στο σώμα σας και ονομάζονται προσταγλανδίνες. Οι προσταγλανδίνες ευθύνονται για την αίσθηση του πόνου. Όταν η σύνθεσή τους αναστέλεται, επέρχεται ανακούφιση από τον πόνο.

Ποια είναι η χρήση του Granelock

Το Granelock χρησιμοποιείται για να ανακουφίσει τα συμπτώματα της ημικρανίας όπως πονοκέφαλο, ναυτία ή έμετο, σε ενήλικες άνω των 18 ετών.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Granelock

Μην πάρετε το Granelock

- σε περίπτωση αλλεργίας στις δραστικές ουσίες ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). Τα συμπτώματα μια αλλεργικής αντίδρασης περιλαμβάνουν: εξάνθημα, δυσκολία στην κατάποση και την αναπνοή, πρήξιμο (οίδημα) των χειλιών, του προσώπου, του λαιμού ή της γλώσσας.
- εάν έχετε αιμορραγία ή απόφραξη στο στομάχι ή στο έντερό σας.
- εάν είχατε ποτέ ακούσιες κινήσεις που δεν μπορείτε να ελέγξετε κυρίως στη γλώσσα, το στόμα, το σαγόνι, τα χέρια και τα πόδια μετά τη λήψη μετοκλοπραμίδης ή φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για να καταπραΰνουν συναισθηματικά και ψυχικά προβλήματα.
- εάν έχετε επιληψία.

- εάν εγχειριστήκατε στο στομάχι ή το έντερό σας. Μην το πάρετε κατά τη διάρκεια των πρώτων 3-4 ημερών μετά την εγχείρησή σας.
- εάν έχετε όγκο των επινεφριδίων (που ονομάζεται φαιοχρωμοκύττωμα).
- εάν παίρνετε ένα φάρμακο που ονομάζεται λεβοντόπα, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του Παρκινσον (βλ. παρακάτω «Άλλα φάρμακα και Granelock»).

Μην πάρετε το Granelock εάν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω για εσάς. Αν δεν είστε βέβαιοι, απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Granelock.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Προσέξτε ιδιαίτερα με το Granelock

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Granelock εάν:

- Έχετε σοβαρά νεφρικά προβλήματα
- Έχετε σοβαρά ηπατικά προβλήματα, τα οποία έχουν προκληθεί από την κατανάλωση αλκοόλ
- Είστε ηλικιωμένος (65 ετών και άνω)

Αν δεν είστε βέβαιοι, εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Granelock.

Παιδιά

Το Granelock δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς κάτω των 18 ετών

Άλλα φάρμακα και Granelock

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Αυτό ισχύει και για φάρμακα τα οποία έχετε λάβει χωρίς ιατρική συνταγή καθώς και για φυτικά φάρμακα. Αυτό συμβαίνει γιατί το Granelock μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης άλλων φαρμάκων. Επίσης κάποια άλλα φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν το τρόπο δράσης του Granelock.

Όταν παίρνετε το Granelock δεν πρέπει να πάρετε άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη.

Αυτό αφορά παυσίπονα, αντιβηχικά και φαρμακευτικά σκευάσματα για το κρύωμα. Επίσης αφορά έναν μεγάλο αριθμό φαρμακευτικών σκευασμάτων τα οποία χορηγούνται είτε από τον γιατρό είτε είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία.

Μην πάρετε αυτό το φάρμακο και ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε:

Levodopa – Χρησιμοποιείται για τη νόσο του Πάρκινσον.

Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε κάποιο από τα παρακάτω:

Το Granelock ενδέχεται να αυξήσει τη δράση των παρακάτω φαρμάκων:

- Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην ψυχική υγεία γνωστά ως «αντιψυχωσικά».
- Φάρμακα για να επέλθει ηρεμία ή για τη μείωση άγχους (υπνωτικά, αγχολυτικά).
- Φάρμακα που βοηθούν στην επέλευση του ύπνου (ηρεμιστικά, βαρβιτουρικά).
- Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την κατάθλιψη όπως μιρταζαπίνη ή τραζοδόνη.
- Χλωραμφενικόλη – ένα αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται για λοιμώξεις.
- Φάρμακα που εμποδίζουν την πήξη του αίματος (αντιπηκτικά) όπως η βαρφαρίνη.
- Κυκλοσπορίνη – χρησιμοποιείται για να αποτραπεί η απόρριψη των μοσχευμάτων. Ο γιατρός σας μπορεί να αλλάξει τη δόση της κυκλοσπορίνης.
- Κλονιδίνη - χρησιμοποιείται για υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση), ημικρανία ή εξάψεις στην εμμηνόπαυση.
- Ορισμένα φάρμακα για την ανακούφιση μέτριου έως σοβαρού πόνου (παράγωγα μορφίνης) όπως η κωδεΐνη, η διυδροκωδεΐνη ή η δεξτροπροποξυφαΐνη.
- Φάρμακα, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν υπνηλία, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αλλεργική ρινίτιδα, εξανθήματα ή άλλα αλλεργικά συμπτώματα. Τα φάρμακα αυτά

ονομάζονται κατασταλτικά αντισταμινικά όπως η χλωροφαιναμίνη ή η προμεθαζίνη.

Το Granelock ενδέχεται να μειώσει τη δράση των παρακάτω φαρμάκων:

Διγοξίνη - χρησιμοποιείται για καρδιαγγειακά προβλήματα. Ο γιατρός σας μπορεί να σας αλλάξει τη δόση της διγοξίνης.

Τα παρακάτω φάρμακα ενδέχεται να αυξήσουν τη δράση του Granelock:

Δομπεριδόνη (ένα φάρμακο παρόμοιο με τη μετοκλοπραμίδη) - χρησιμοποιείται για να σταματήσει να αισθάνεστε άρρωστος (ναυτία) ή να είστε άρρωστος (έμετος).

Τα παρακάτω φάρμακα μπορεί να μειώσουν τη δράση του Granelock

- Το από του στόματος αντισυλληπτικό χάπι
- Χολεστυραμίνη - για τη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα
- Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μυϊκών σπασμών (αντιχολινεργικά) για σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) όπως μεμπεβερίνη ή υοσκίνη.
- Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της ακράτειας όπως η οξυβουτυνίνη, η προπιβερίνη ή η τολτεροδίνη
- Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του μέτριου έως σοβαρού πόνου (παράγωγα της μορφίνης) όπως κωδεΐνη, διυδροκωδεΐνη ή δεξτροπροποξυφαΐνη

Το Granelock με οιοπνευματώδη

Δεν θα πρέπει να καταναλώνετε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αυτά τα δισκία. Η κατανάλωση αλκοόλ ενώ λαμβάνετε το Granelock μπορεί να σας προκαλέσει υπνηλία.

Κύηση και θηλασμός

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο εάν:

- Είστε έγκυος, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί. Δεν πρέπει να πάρετε το Granelock κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι εβδομάδων της εγκυμοσύνης.
- Θηλάζετε ή σχεδιάζετε να θηλάσετε. Μην θηλάζετε εάν παίρνετε το Granelock, καθώς μικρή ποσότητα μπορεί να περάσει στο μητρικό γάλα.

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Μπορεί να αισθανθείτε υπνηλία μετά τη λήψη αυτού του φαρμάκου. Αυτό είναι πιο πιθανό εάν έχετε καταναλώσει αλκοόλ ή έχετε πάρει άλλα φάρμακα που προκαλούν υπνηλία. Εάν αυτό συμβεί μην οδηγήσετε ή μην χειριστείτε εργαλία ή μηχανήματα

3. Πώς να πάρετε το Granelock

Πάντοτε να παίρνετε το Granelock αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Παίρνοντας αυτό το φάρμακο

Να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο από το στόμα

Μην πάρετε περισσότερη από τη συνιστώμενη δόση

Εάν συνεχίζετε να νιώθετε άρρωστος-ναυτία (κάνετε έμετο) μετά τη λήψη αυτού του φαρμάκου, ενημερώστε το γιατρό σας.

Εάν νιώσετε ότι η επίδραση του φαρμάκου είναι ασθενής ή ισχυρή μην αλλάξετε τη δόση μόνος σας, αλλά ρωτήστε το γιατρό σας.

Η συνιστώμενη δόση

Ενήλικες (18 ετών και άνω) και ηλικιωμένοι

- Η συνιστώμενη δόση είναι 2 δισκία με την πρώτη ένδειξη πριν από μια κρίση ημικρανίας.
- Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν πάρετε άλλη δόση.
- Μην πάρετε παραπάνω από 6 δισκία μέσα σε 24 ώρες.

Χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών

Μην λάβετε αυτό το φάρμακο εάν είστε κάτω των 18 ετών.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση X από την κανονική

- Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση από την κανονική, ακόμα και στην περίπτωση που αισθάνεστε καλά καθώς υπερβολική δόση παρακεταμόλης μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένη σοβαρή ηπατική βλάβη.
- Θυμηθείτε να πάρετε τα δισκία που έχουν μείνει και το κουτί μαζί σας. Ωστε ο γιατρός σας να γνωρίζει τι έχετε πάρει.

Τα παρακάτω επιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν.

- Να αισθάνεστε ναυτία και να έχετε έμετο, να έχετε ασυνήθιστα χλωμή όψη προσώπου, απώλεια της όρεξης, πόνο στο στομάχι. Άλλα αποτελέσματα όπως υπνηλία, μη-ελεγχόμενη, ταχεία ανατάραξη του σώματος (σπασμοί), μυϊκοί σπασμοί και μη ελεγχόμενες κινήσεις μπορεί να συμβούν.
- Σοβαρό πόνο στο στομάχι που μπορεί να αντανακλάται στην πλάτη. Αυτό μπορεί να είναι σύμπτωμα παγκρεατίτιδας.
- Μπορεί επίσης να αισθανθείτε ότι τα άκρα σας είναι πρησμένα (κατακράτηση υγρών). Αυτό είναι ένα σημάδι αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας των νεφρών σας
- Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να παρουσιάσετε ανώμαλους καρδιακούς παλμούς, γρήγορη και βαθιά αναπνοή και αίσθημα αδυναμίας. Μπορεί ακόμη να αναπτύξετε ηπατικά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν κιτρίνισμα του ματιού ή της επιδερμίδας και στις σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να επέλθει έλλειψη συνείδησης (αποπροσανατολισμός), σύγχυση, αιμορραγία στο στομάχι ή στο έντερο, απώλεια συνείδησης (κόμα) και θάνατος.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Granelock

Εάν ξεχάσατε να πάρετε μία δόση την προβλεπόμενη στιγμή, πάρτε την αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Ωστόσο μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Θυμηθείτε να αφήνετε να μεσολαβήσουν τουλάχιστον 4 ώρες ανάμεσα στις δόσεις.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Διακόψτε τη θεραπεία και απευθυνθείτε ένα γιατρό ή πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο αμέσως εάν:

- Παρουσιάσετε αλλεργική αντίδραση. Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις μπορεί να παρουσιαστούν πολύ σπάνια και συνήθως εκδηλώνονται σύντομα μετά τη λήψη του Granelock. Τα συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνονται είναι δυσκολία στην αναπνοή, σφίξιμο στο λαιμό, ταχέως εξαπλωμένα εξανθήματα, ζάλη, πολύ γρήγορο καρδιακό ρυθμό ή ακόμη και απώλεια συνείδησης.
- Λαχανιάζετε, μελανιάζετε, έχετε πονοκέφαλο κόπωση, ζαλάδα και απώλεια συνείδησης. Αυτά μπορεί να είναι συμπτώματα μιας πολύ σπάνιας αλλά σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας που ονομάζεται μεθαιμοσφαιριναιμία.

- Έχετε πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση), τα συμπτώματα της οποίας μπορεί να περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, ζάλη, σύγχυση, κόπωση.
- Είστε πιο χλωμός/ή από το φυσιολογικό, παρουσιάζετε εφίδρωση, πυρετό, γρήγορο καρδιακό παλμό, δύσκαμπτους μύες, γρήγορη αναπνοή και σύγχυση, υπνηλία ή νευρική κατάσταση. Αυτά μπορεί να είναι ενδείξεις σοβαρής παρενέργειας που ονομάζεται κακώθης νευροληπτικό σύνδρομο.
- Παρουσιάζετε λαχάνιασμα, αργό καρδιακό παλμό και πόνο στο στήθος.
- Παρουσιάζετε σπασμούς (επιληπτική κρίση)
- Παρουσιάζετε σοβαρές δερματικές αντιδράσεις. Περιπτώσεις δερματικών αντιδράσεων έχουν παρατηρηθεί σπανίως.

Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας εάν εμφανίσετε κάποια από τις ακόλουθες σοβαρές παρενέργειες:

- Πρόβλημα στον έλεγχο μυών ή εάν έχετε μυϊκούς σπασμούς ή μη ελεγχόμενες κινήσεις. Οι μυς που επηρεάζονται μπορεί να είναι της γλώσσας, του στόματος, του σαγονιού, των χεριών και των ποδιών. Οι σπασμοί μπορεί να προκαλέσουν ασυνήθιστες κινήσεις στο πρόσωπο, στη γλώσσα, στα μάτια, στο λαιμό και να επηρεάσουν το λόγο, τις εκφράσεις προσώπου και να οδηγήσουν σε μη φυσιολογική τοποθέτηση του κεφαλιού και των ώμων.
- Μειωμένο επίπεδο συνείδησης, σύγχυση, ψευδαισθήσεις.
- Άκαμπτοι ή δύσκαμπτοι μύες, τρόμος ή δυσκολία κίνησης.
- Αποκτάτε μώλωπες πιο εύκολα από το συνηθισμένο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μια διαταραχή του αίματος (θρομβοπενία).
- Παθαίνετε λοιμώξεις πιο συχνά και πιο εύκολα από το φυσιολογικό. Αυτό μπορεί να οφείλεται επειδή έχετε χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (ακοκκιοκυτταραιμία).
- Κατάθλιψη.

Ενημερώστε το γιατρό σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα εάν εμφανίσετε κάποια από τις ακόλουθες παρενέργειες:

- Διάρροια.
- Ζάλη, τάσεις λιποθυμίας, λιποθυμία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Ενημερώστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν κάποια από τις ακόλουθες παρενέργειες γίνει σοβαρή ή εάν διαρκέσει περισσότερο από λίγες μέρες:

- Μη φυσιολογική παραγωγή μητρικού γάλακτος σε άνδρες και γυναίκες
- Γυναικομαστία σε άνδρες
- Απώλεια εμμήνου ρήσης
- Νευρική κατάσταση, ανησυχία ή σύγχυση
- Αίσθημα υπνηλίας
- Έλλειψη ή απώλεια αντοχής (αδυναμία)
- Εξάνθημα

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585. Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσετε το Granelock

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην κυψέλη και στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Granelock

- Οι δραστικές ουσίες είναι η παρακεταμόλη και η υδροχλωρική μετοκλοπραμίδη. Κάθε δισκίο περιέχει 500 mg παρακεταμόλης και 5 mg υδροχλωρικής μετοκλοπραμίδης.
- Τα άλλα συστατικά έκδοχα είναι Cellulose microcrystalline, Gelatin, Silica Colloidal Anhydrous και Magnesium stearate.

Εμφάνιση του Granelock και περιεχόμενα της συσκευασίας

Λευκά δισκία. Το Granelock διατίθεται σε συσκευασίες των 20 και 30 δισκίων, σε κυψέλες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Nassington LTD

Ιπποκράτους 3Α Ακρόπολη, 2006, Λευκωσία, Κύπρος

Παρασκευαστής

ONE PHARMA Industrial Pharmaceutical Company Societe Anonyme

60⁰ χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Σχηματάρι Βοιωτίας 3200 Ελλάδα

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις