

## **ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

## Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

### BronchoGrip

Παρακεταμόλη 500 mg/Γουαϊφενεσίνη 100 mg/Υδροχλωρική φαινυλεφρίνη 6.1 mg  
σκληρά καψάκια

**Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.**

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Απευθυνθείτε στον φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
- Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα μετά από 3 ημέρες.

#### Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

- 1 Τι είναι το BronchoGrip και ποια είναι η χρήση του
- 2 Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το BronchoGrip
- 3 Πώς να πάρετε το BronchoGrip
- 4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
- 5 Πώς να φυλάσσετε το BronchoGrip
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

#### 1. Τι είναι το BronchoGrip και ποια είναι η χρήση του

Το BronchoGrip περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

- Παρακεταμόλη που είναι ένα παυσίπονο (αναλγητικό) για πόνους συμπεριλαμβανομένων του πονοκέφαλου και του πονόλαιμου, και επίσης βοηθάει στη μείωση της θερμοκρασίας σας όταν έχετε πυρετό (αντιπυρετικό).
- Γουαϊφενεσίνη που είναι ένα αποχρεμπτικό που βοηθάει στο να μαλακώσει η βλέννα(φλέγμα) όταν έχετε παραγωγικό βήχα.
- Υδροχλωρική φαινυλεφρίνη που είναι ένα αποσυμφορητικό που χρησιμοποιείται για τη μείωση του πρηξίματος στις ρινικές διόδους, ώστε να σας βοηθά να αναπνέετε ευκολότερα.

Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για τη βραχυπρόσθεσμη ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρίπης, που περιλαμβάνουν ήπιο έως μέτριο πόνο, πονοκέφαλο, ρινική συμφόρηση και πονόλαιμο, ρίγη και πυρετό, και για την ανακούφιση του παραγωγικού βήχα. Το BronchoGrip πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν έχετε συνδυασμό συμπτωμάτων κρυολογήματος και γρίπης όπως πόνος/πυρετός, ρινική συμφόρηση και παραγωγικό βήχα.

Αυτό το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ενήλικες, ηλικιωμένους και εφήβους ηλικίας 16 ετών και άνω.

Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα μετά από 3 ημέρες.

#### 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το BronchoGrip

##### Μην πάρετε το BronchoGrip

- σε περίπτωση αλλεργίας στην παρακεταμόλη, γουαϊφενεσίνη, υδροχλωρική φαινυλεφρίνη ή σε

- οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- εάν παίρνετε ή έχετε πάρει τις τελευταίες 14 ημέρες, αντικαταθλιπτικά που ανήκουν στους αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟΙs), όπως μοκλοβεμίδη, φαινελζίνη, ισοκαρβοξαζίδη, τρανυλκυπρομίνη.
  - εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση).
  - εάν έχετε καρδιακή ή αγγειακή νόσο (καρδιαγγειακή νόσο).
  - εάν έχετε υπερδραστήριο θυρεοειδή (υπερθυρεοειδισμό).
  - εάν έχετε διαβήτη.
  - εάν έχετε σπάνιο επινεφριδιακό όγκο (φαιοχρωμοκύττωμα).
  - εάν παίρνετε τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά όπως μιπραμίνη και αμιτριπυλίνη.
  - εάν παίρνετε β-αποκλειστές ή άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης.
  - εάν έχετε γλαύκωμα κλειστής γωνίας (αυξημένη πίεση στα μάτια).
  - εάν έχετε σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία.
  - εάν είστε έγκυος.
  - εάν παίρνετε άλλα αποσυμφορητικά που περιέχουν συμπαθομιμητικές αμίνες (π.χ. φαινυλεφρίνη).

### **Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις**

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν:

- τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από 3 ημέρες.
- τα συμπτώματα επιδεινωθούν.
- αναπτύξετε υψηλό πυρετό ή άλλα συμπτώματα.

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το BronchoGrip, εάν:

- έχετε διαταραχές του κυκλοφορικού όπως μια νόσος που ονομάζεται Φαινόμενο Raynaud, η οποία προκύπτει από κακή κυκλοφορία στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών.
- παίρνετε φάρμακα που επηρεάζουν τη λειτουργία του ήπατος.
- έχετε ανεπάρκεια ενζύμου ή μεταβολική διαταραχή (ανεπάρκεια αφυδρογονάσης 6-φωσφορικής γλυκόζης, ανεπάρκεια γλουταθειόνης ή οικογενή μη αιμολυτικό ίκτερο).
- έχετε μια διαταραχή που προκαλεί την καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων γρηγορότερα από ότι αυτά που δημιουργούνται (αιμολυτική αναιμία).
- είστε αφυδατωμένοι.
- έχετε δυσκολία στην ούρηση ή διογκωμένο προστάτη.
- έχετε χρόνια βήχα, άσθμα ή εμφύσημα.
- έχετε συχνά ή καθημερινά πονοκεφάλους.
- έχετε άσθμα και έχετε ευαισθησία στο ακετυλοσαλικυλικό οξύ.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση εάν έχετε προβλήματα με το ήπαρ ή τους νεφρούς, είστε ελλιποβαρής (<50 kg), είστε υποσιτισμένος/η ή πίνετε αλκοόλ τακτικά, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο βλάβης στο ήπαρ. Ίσως χρειαστεί να μειώσετε την ποσότητα παρακεταμόλης που παίρνετε ή να αποφύγετε εντελώς τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Αυτό το προϊόν περιέχει παρακεταμόλη. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ταυτόχρονα με άλλα προϊόντα που περιέχουν παρακεταμόλη.

### **Παιδιά και έφηβοι**

Μη δίνετε αυτό το φάρμακο σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 16 ετών.

### **Άλλα φάρμακα και BronchoGrip**

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Εάν παίρνετε κάποιο από τα ακόλουθα φάρμακα, μην πάρετε το BronchoGrip (βλ. παράγραφο «Μην πάρετε το BronchoGrip»):

- Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά όπως η ιμιπραμίνη και η αμιτριπυλίνη.
- Αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟΙ's) όπως μοκλοβεμίδη, φαινελζίνη, ισοκαρβοξαζίδη και τρανυλκυπρομίνη, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης.
- Φάρμακα γνωστά ως β-αποκλειστές, όπως η μετοπρολόλη και η ατενολόλη.
- Άλλα προϊόντα που περιέχουν συμπαθομιμητικές αμίνες όπως η φαινυλεφρίνη.
- Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης όπως η γουανεθιδίνη, η ρεσερπίνη και η μεθυλντόπα.

Εάν παίρνετε κάποιο από τα ακόλουθα φάρμακα, ενημερώστε τον γιατρό σας πριν πάρετε το BronchoGrip:

- Προβενεσίδη που χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας.
- Φάρμακα για τη θεραπεία υψηλών επιπέδων χοληστερόλης που μειώνουν την ποσότητα λιπιδίων στο αίμα, όπως η χολεστυραμίνη.
- Φάρμακα για τον έλεγχο της ναυτίας ή κατά της ναυτίας, όπως η μετοκλοπραμίδη ή η δομπεριδόνη.
- Φάρμακα που ονομάζονται αντιπηκτικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αραιώση του αίματος, όπως η βαρφαρίνη ή άλλες κουμαρίνες. Μπορείτε να λαμβάνετε περιστασιακά δόσεις παρακεταμόλης, αλλά θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν πρέπει να το παίρνετε σε τακτική βάση.
- Το αντιβιοτικό χλωραμφενικόλη.
- Φάρμακα για τη θεραπεία καρδιακών παθήσεων, όπως διγοξίνη.
- Φάρμακα για τη θεραπεία της ημικρανίας όπως η εργοταμίνη και η μεθυσεργίδη.
- Άλλα φάρμακα για τον βήχα.
- Άλλα φάρμακα για τη γρίπη και το κρυολόγημα.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο εάν πρόκειται να κάνετε εξετάσεις ούρων επειδή η λήψη αυτού του φαρμάκου μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα.

### **Το Bronchogrip με οινόπνευματώδη**

Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη λήψη αυτού του φαρμάκου.

### **Κύηση και θηλασμός**

#### Κύηση

Μην πάρετε αυτό το φάρμακο εάν είστε έγκυος ή νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος.

Εάν σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Βάσει εμπειρίας σε ανθρώπους, η υδροχλωρική φαινυλεφρίνη προκαλεί συγγενή δυσπλασία όταν χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

#### Θηλασμός

Αυτό το φάρμακο δεν πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του θηλασμού χωρίς ιατρική συμβουλή.

### **Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων**

Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ζάλη. Μην οδηγείτε ή χειρίζεστε μηχανήματα εάν αισθάνεστε ζάλη μετά τη λήψη αυτού του φαρμάκου.

Αυτό το φάρμακο περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση (2 κάψουλες), δηλαδή είναι ουσιαστικά «χωρίς νάτριο».

### **3. Πώς να πάρετε το BronchoGrip**

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

### **Ενήλικες και έφηβοι ηλικίας 16 ετών και άνω που ζυγίζουν πάνω από 50 κιλά**

Η συνιστώμενη δόση είναι 2 καψάκια κάθε 4 έως 6 ώρες, όπως απαιτείται με μέγιστο τις 3 δόσεις μέσα

σε 24 ώρες. Μην υπερβαίνετε την αναφερόμενη δόση. Μην πάρετε περισσότερα από 6 καψακία (3g παρακεταμόλη) σε διάστημα 24 ωρών.

Το BronchoGrip δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ενήλικες, ηλικιωμένους και εφήβους ηλικίας 16 ετών και άνω, οι οποίοι ζυγίζουν λιγότερο από 50 κιλά.

Μην πάρετε περισσότερα από 4 καψακία την ημέρα στις ακόλουθες καταστάσεις, εκτός εάν σας δοθούν οδηγίες από τον γιατρό σας:

- Χρόνιος αλκοολισμός
- Αφυδάτωση
- Υποσιτισμός

#### **Χρήση σε ηλικιωμένους ασθενείς και σε ασθενείς με ηπατική ή νεφρική νόσο**

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο εάν είστε ηλικιωμένος ή έχετε νεφρική ή ηπατική νόσο επειδή μπορεί να χρειαστείτε χαμηλότερη ή λιγότερο συχνή δόση.

#### **Χρήση σε παιδιά και εφήβους**

Να μην δίνετε σε παιδιά και εφήβους κάτω των 16 ετών.

Από του στόματος χρήση.

Καταπίνετε το καψάκιο ολόκληρο με νερό. Μην μασάτε το καψάκιο.

Πρέπει να μιλήσετε με έναν γιατρό εάν τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από 3 ημέρες, επιδεινωθούν ή εμφανιστούν άλλα συμπτώματα.

#### **Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση BronchoGrip από την κανονική**

Μιλήστε αμέσως με έναν γιατρό εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση από την κανονική από αυτό το φάρμακο, ακόμα κι αν αισθάνεστε καλά. Αυτό συμβαίνει επειδή η υπερβολική δόση παρακεταμόλης μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένη, μη αναστρέψιμη ηπατική βλάβη. Τα αρχικά συμπτώματα υπερδοσολογίας μπορεί να περιλαμβάνουν ωχρό δέρμα, ναυτία, έμετο και κοιλιακό άλγος. Μεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Πάρτε μαζί το φάρμακό σας και αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης.

#### **Εάν ξεχάσετε να πάρετε το BronchoGrip**

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

#### **4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες**

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη λήψη αυτού του φαρμάκου. Ωστόσο, εάν εμφανίσετε κάποια από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες ή συμβεί οτιδήποτε άλλο ασυνήθιστο, **ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να παίρνετε αμέσως το φάρμακο** και επισκεφτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

- Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις
- Αλλεργικές αντιδράσεις που μπορεί να είναι σοβαρές όπως δερματικό εξάνθημα, κνησμός, πρησμένες ερυθρές περιοχές του δέρματος, μερικές φορές με δύσπνοια ή πρήξιμο του στόματος, των χειλιών, της γλώσσας, του λαιμού ή του προσώπου
- Αλλαγές στο αίμα σας που μπορεί να σας κάνουν πιο επιρρεπείς σε αιμορραγία, μώλωπες, πυρετό και λοιμώξεις, όπως πονόλαιμο και έλκη
- Προβλήματα ή πόνος κατά την ούρηση
- Αυξημένη πίεση στο μάτι (γλαύκωμα οξείας γωνίας)

- Διεσταλμένες κόρες οφθαλμών
- Αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία είναι πιο πιθανά εάν τα έχετε αντιμετωπίσει στο παρελθόν όταν παίρνετε άλλα παυσίπονα όπως το ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή η ιβουπροφαίνη.
- Αυξημένη αρτηριακή πίεση
- Ταχύτερος, πιο αργός ή ακανόνιστος καρδιακός παλμός ανάπαυσης
- Ηπατικά προβλήματα

Η συχνότητα των παραπάνω ανεπιθύμητων ενεργειών είναι σπάνια (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 1.000 άτομα) ή πολύ σπάνια (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 10.000 άτομα). Η συχνότητα των προβλημάτων ή πόνου κατά την ούρηση είναι άγνωστη.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες αυτού του φαρμάκου παρουσιάζονται παρακάτω ανάλογα με το πόσο συχνά αναφέρθηκαν.

Η συχνότητα των ακόλουθων ανεπιθύμητων ενεργειών είναι άγνωστη:

- Δυσκολία στον ύπνο (αϋπνία)
- Νευρική κατάσταση
- Πονοκέφαλος
- Ζάλη
- Μούδιασμα ή παγωμένο δέρμα

Η συχνότητα των ακόλουθων ανεπιθύμητων ενεργειών είναι σπάνια (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 1.000 άτομα):

- Πόνος στο στομάχι ή δυσφορία
- Διάρροια (αναστατωμένο στομάχι)
- Ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας)
- Έμετος (αδιαθεσία)

Η συχνότητα των ακόλουθων ανεπιθύμητων ενεργειών είναι πολύ σπάνια (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 10.000 άτομα):

- Θολά ούρα (λόγω αυξημένων λευκών αιμοσφαιρίων στα ούρα)

#### **Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών**

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

#### **5. Πώς να φυλάσσετε το BronchoGrip**

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στην κυψέλη (blister) μετά τη λέξη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

## 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

### Τι περιέχει το BronchoGrip

- Οι δραστικές ουσίες είναι Παρακεταμόλη, Γουαϊφενεσίνη και Υδροχλωρική φαινυλεφρίνη.
- Κάθε καψάκιο περιέχει Παρακεταμόλη (500 mg), Γουαϊφενεσίνη (100 mg) και Υδροχλωρική φαινυλεφρίνη 6.1 mg (που αντιστοιχεί σε 5 mg βάσης φαινυλεφρίνης).
- Τα άλλα συστατικά είναι: άμυλο αραβοσίτου, καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη, νάτριο λαουρυλοθειικό, μαγνήσιο στεατικό, τάλκης. Κέλυφος καψακίου ζελατίνης: ζελατίνη, νάτριο λαουρυλοθειικό, κίτρινο κινολίνης (E104), ινδικοκαρμίνιο (E132), ερυθροσίνη (E127), τιτανίου διοξείδιο (E171), ύδωρ κεκαθαρισμένο.

### Εμφάνιση του BronchoGrip και περιεχόμενα της συσκευασίας

Αυτό το φάρμακο παρουσιάζεται ως σκούρο μπλε και πράσινο σκληρό καψάκιο ζελατίνης που περιέχει υπόλευκη σκόνη. Τα καψάκια παρέχονται σε πλαστική συσκευασία κυψέλης με φύλλο από χαρτί /αλουμίνιο.

Αυτό το φάρμακο είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες των 8, 16, 24 και 32 καψακίων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

### Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

#### Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ,  
Αριστοτέλους 19-21, 14451 Μεταμόρφωση, Ελλάδα  
Τηλέφωνο: +302108188900

#### Παρασκευαστής

Omega Pharma International NV  
Venecoweg 26, Nazareth, 9810  
Βέλγιο

**Αυτό το φάρμακο έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:**

Βουλγαρία	Колдрекс Макс Плюс Каплица (Coldrex Max Plus Cough)
Κροατία	Coldrex ComboGrip
Κύπρος	Solpadeine Cold & Flu
Τσεχία	Προς επιβεβαίωση
Εσθονία	Coldrex MaxGrip
Ελλάδα	BronchoGrip
Ουγγαρία	Προς επιβεβαίωση
Ιρλανδία	Paracetamol 500mg, Guafenesin 100mg, Phenylephrine hydrochloride 6.1mg capsules, hard
Λετονία	Προς επιβεβαίωση
Λιθουανία	Coldrex MaxGrip 500 mg/100 mg/6,1 mg kietosios kapsulės
Πολωνία	Coldrex Complex Grip
Πορτογαλία	Antigrippine Maxeffect Tosse
Ρουμανία	Coldrex MaxGrip Răceală și Tuse capsule (Coldrex MaxGrip Plus Cough Capsules)
Σλοβακία	Coldrex Grip plus kašel

Σλοβενία

Combocoldrex 500 mg/100 mg/6,1 mg trde kapsule

**Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}**